3618

永樂大典卷之三千六百十五

十寒

寒

諸寒證治十

張仲景傷寒論辨太陽病脉證并治太陽病項背強。几几無汗惡風。葛根湯主之。成無已註。太陽病項背強。几几汗出惡風者。中風表虛也。項背強几几無汗惡風者。中風表實也。表虛宜解肌。表實宜發汗。是以葛根湯發之也。

太平聖惠方太陽病項背強無汗而惡風者宜麻黃湯。

許叔微普濟本事方。有人患傷寒無汗惡風。項既屈而且強。予曰。項強几几。葛根湯證。或人問曰。何謂几几。予曰。几几者。如几几足疾屈而強也。謝復古謂病人羸弱。須憑几而起。誤也。蓋仲景論中極有難曉處。振振欲擗地。心中懊憹。外氣怫鬱。鬱冒不仁。膈內拒痛。如此之類甚多。熙寧中。邠守宋迪因其猶子感傷寒之初。不能辨其病證。見其煩渴而汗。多以涼藥解治之。至於再三。遂成陰毒。六日卒。迪痛悼之。遂著陰毒形證訣三篇。雲岐子保命集。太陽經病項背強頭痛。太陽從上至足。几几而無汗。肌熱者。屬陽明惡風在表也。脉浮而過於平脉。宜葛根湯。太陽經病。頭痛項背強。几几而

熱不惡風目疼鼻乾而利者傳陽明也脉浮大而長傳胃則嘔宜葛根湯
太陽傷寒中風經與經合尺寸俱長陽明受病當二三日發以其脉夾鼻
絡於目故身熱目疼鼻乾不得卧陽明經始於鼻交頻中從頭下至足行
身之前為表之裏其陽明經摽熱本實摽陽則熱本於胃胃者水穀之海
故本實其從摽則浮而長從本則沉而實陽明為肌肉之本摽病身熱蒸
蒸而不惡寒本實胃中燥鼻乾目疼几几而熱陽明禁發汗在本者不禁
下發之則變黃證太陽主表榮衛是也榮衛之下肌肉屬陽明二陽併病
葛根湯主之衛者桂枝榮者麻黃榮衛之中麻黃桂枝各半湯榮衛之下
肌肉之分者葛根湯又名解肌湯　汪疇傷寒發明書云若自汗惡風者
名曰中風

葛根湯方

葛根四兩　麻黃三兩去節　桂二兩去皮　芍藥二兩切
甘草二兩炙　生薑三兩切　大棗十二枚擘
本草云輕可去實麻黃葛根之屬是也此以中風表實故加二物於
桂枝湯中也

右七味㕮咀以水一斗先煮麻黃葛根減二升去沫內諸藥煮取三
升去滓溫服一升覆取微似汗不須啜粥餘如桂枝法將息及禁忌

太陽與陽明合病者必自下利葛根湯主之成無已註傷寒有合病有併
病本太陽病不解併於陽明者謂之併病三經俱受邪相合病者謂之合
病合病者邪氣甚也太陽陽明合病者與太陽少陽合病陽明少陽合病
皆言必自下利有以邪氣併於陰則陰實而陽虛邪氣併於陽則陽實而
陰虛寒邪氣甚客於二陽二陽方外實而不主裏則裏氣虛故必下利與
葛根湯以散經中甚邪　索矩傷寒新書云合病者初覺病便兩經或三
經相合受邪是也　朱肱傷寒活人書又問二陽有合病有併病何也答
曰脉浮大而長頭疼腰痛肌熱目疼鼻乾者合病也太陽初得病時發其
汗汗先出不徹因轉屬陽明續自微汗出不惡寒者併病也三陽皆有合
病唯三陰無合病不可不知也太陽證罷但發潮熱手足漐漐汗出大便
難而譫語者下之愈宜大承氣湯若太陽證不罷不可下宜用桂枝麻黃
各半湯小發汗設面赤色者陽氣怫鬱在表當解之熏之若發汗不大徹
則陽氣怫鬱不得越散當汗不汗煩躁不知痛處其人短氣但坐以汗出
不徹故也更以麻黃湯發其汗則愈何以知汗出不徹以脉濇故知之
趙嗣眞活人百問釋疑第二問又云太陽與陽明合病脉必浮大而長外

證必頭疼腰痛肌熱目疼鼻乾也。愚詳此問太陽陽明合病其論脉固然也。其證治則非也。何者。蓋仲景論所出合病證治有三。自下利者葛根湯不下利但嘔者葛根加半夏湯喘而胷滿者麻黃湯此問皆不言何耶。却以己意云惡寒者升麻湯不惡寒反惡熱大便不秘者白虎湯解利之不惡寒反惡熱大便秘或讝語者承氣湯下之上件皆是治陽明經自病藥不可以治合病非特此爾。少陽門中亦不該載太陽少陽合病併病又何耶。愚嘗疑合病與併病之為難明也久矣。今始釋之。蓋合病者二陽經或三陽經同受病。病之不傳者也。且如太陽陽明併病一證。若併而未盡是傳未過。尚有表證。仲景所謂太陽證不罷。面色赤。陽氣怫鬱在表不得越煩躁短氣是也。猶當汗之以各半湯。若併之已盡。是為傳過。仲景所謂太陽證罷。潮熱手足汗出。大便難而讝語者是也。法當下之以承氣湯。是知傳則入府。不傳則不入府。所以仲景論太陽陽明合病止出三證如前。於太陽陽明併病則言其傳變如此也。又三陽經互相合病皆自下利。仲景於太陽陽明合病則主以葛根湯。太陽少陽合病主以黃芩湯。少陽陽明合病主以承氣湯。至於太陽少陽併病其證頭項強痛眩冒如結胷心下痞鞕當刺大椎肺俞肝俞。不可汗下。少陽陽明併病本論闕。又三陽合病一證。獨有證治見後問。三陽若與三陰合病即是兩感。所以三陰無合病例也。

太陽與陽明合病不下利但嘔者葛根加半夏湯主之。成無己註。邪氣外甚。陽不主裏。裏氣不和。氣下而不上者。但下利而不嘔。裏氣上逆而不下者。但嘔而不下利。與葛根湯以散其邪。加半夏以下逆氣。雲岐子保命集。太陽經與陽明合病。頭痛項強。身熱不惡風。脉浮弦不下利。陽明本實。但嘔者。少陽也。宜服葛根加半夏湯。

葛根加半夏湯方

葛根四兩　麻黃三兩去節。湯泡去黃汁。焙乾秤　生薑三兩切　甘草二兩炙　芍藥二兩　桂枝二兩去皮　大棗十二枚劈　半夏半升洗

右八味。以水一斗先煮葛根麻黃減二升去白沫。內諸藥煮取三升。去滓。溫服一升。覆取微似汗。

太陽病桂枝證。醫反下之。利遂不止。脉促者表未解也。喘而汗出者葛根黃芩黃連湯主之。成無己註。經曰不宜下而便攻之。內虛熱入。協熱遂利。桂枝證者。邪在表也。而反下之。虛其腸胃。為熱所乘。遂利不止。邪在表則見陽脉。邪在裏則見陰脉。下利脉微遲。邪在裏也。促為陽盛。雖下利而脉

促者知表未解也病有汗出而喘者為自汗出而喘也即邪氣外甚所致喘而汗出者為因喘而汗出也即裏熱氣逆所致與葛根黃芩黃連湯散表邪除裏熱　雲岐子保命集太陽經與陽明標為病頭痛項強身熱鼻乾脉浮大而長當葛根湯解肌從陽明之治也若無陽明脉證獨有太陽脉浮自汗惡風桂枝湯主之反下之裏虛利不止脉浮大而長者葛根加黃芩黃連湯黃連苦而堅內能止下利黃芩苦寒主表熱裏實是以加之

葛根黃芩黃連湯方

葛根半斤　甘草二兩炙味甘平　黃芩二兩味苦寒　黃連三兩味苦寒

內經曰辛甘發散為陽表未解者散以葛根甘草之甘苦以堅之裏氣弱者堅以黃芩黃連

右四味以水八升先煮葛根減二升內諸藥煮取二升去滓分溫再服王燾外臺秘要方忌豬肉冷水海藻菘菜

太陽病頭痛發熱身疼腰痛骨節疼痛惡風無汗而喘者麻黃湯主之成無已註此太陽傷寒也寒則傷榮頭痛身疼腰痛以至牽連骨節疼痛者太陽經榮血不利也內經曰風寒客於人使人毫毛畢直皮膚閉而為熱者寒在表也風并於衛衛實而榮虛者自汗出而惡風寒也寒并於榮榮實而衛虛者無汗而惡風以榮強衛弱故氣逆而喘與麻黃湯以發其汗

龐安時傷寒總病論云傷寒之脉緊盛而按之澀是也脉浮而緊浮為風緊為寒風傷衛寒傷榮榮衛俱病骨節煩疼外證必發熱無汗或喘其人但憎寒手足指末必微厥久而復溫掌心不厥此傷寒無汗用麻黃證凡脉浮數或浮緊無汗小便不數病雖十餘日尚宜麻黃湯也　索矩傷寒新書云中風與傷寒並可投桂枝麻黃若分中風自汗用桂枝者其虛人也傷寒無汗用麻黃者其實人也由此中風自汗實人者麻黃亦可用傷寒無汗虛人者桂枝亦不可用故曰桂枝麻黃於中風傷寒並可投也桂枝湯虛人可服非實人亦可服者兼麻黃在中麻黃湯實人可服然虛人亦可服者兼附子在中餘兼藥微此　朱肱傷寒活人書云傷寒熱病藥性須涼不可太溫夏後麻黃湯須加知母半兩石膏一兩黃芩一分蓋麻黃性熱夏月服之有發黃斑出之失唯冬及春與病人素虛寒者乃用正方不在加減　許叔微普濟本事方論麻黃湯加減法並依活人書仲景論傷寒一則桂枝二則麻黃三則青龍桂枝治中風麻黃治傷寒青龍治中風見寒脉傷寒見風脉三者如鼎立人皆能言之而不曉前人處方

用藥之意。故醫者多不用。無足怪也。且脉浮而緩者。中風也。故嗇嗇惡寒。淅淅惡風。翕翕發熱。仲景以桂枝對之。浮緊而濇者傷寒也。故頭痛發熱身疼腰痛。骨節疼痛。惡風無汗而喘。仲景以麻黃對之。至於中風脉浮緊傷寒脉浮緩。仲景皆以青龍對之何也。予嘗深究三者若證候與脉相對用之無不應手而愈。何以言之。風傷衛。衛氣也。寒傷榮。榮血也。榮行脉中衛行脉外。風傷衛。則風邪干陽氣。陽氣不固。發越而為汗。是以自汗而表虛。故仲景用桂枝以發其邪。芍藥以治其血。蓋中風則病在脉之外。其病稍輕。雖同曰發汗。特解肌之藥耳。故仲景於桂枝證云。令半身漐漐微似有汗者佳。不可如水淋漓。病必不除。是知中風不可大發汗。汗過則反動榮血。邪氣乘虛而襲之。故病不除也。寒傷榮則寒邪入陰血。而榮行脉中者也。寒邪居脉中。非特榮受病。邪自內作。則并與衛氣犯之。久則浸淫及骨。是以汗不出而熱齒乾以煩冤。仲景以麻黃發其汗。又以桂枝甘草助其發散。滌除內外之邪。榮衛之病爾。大抵二藥皆發汗。而桂枝則發其衛之邪。麻黃并榮衛治之。亦自有深淺也。何以驗之。仲景桂枝第十九證云。病常自汗出者。此為榮氣和。榮氣和者外不諧。以衛氣不共榮氣諧和故爾。榮行脉中。衛行脉外。復發其汗。榮衛和則愈。宜桂枝湯。又第四十七證云發熱汗出者。此為榮弱衛強。故使汗出。欲散邪風。宜桂枝湯。是知中風汗出者。榮和而衛不和。又第一卷云。寸口脉浮而緊。浮則為風。緊則為寒。風則傷衛。寒則傷榮。榮衛俱病。骨節煩疼。當發其汗。是知傷寒脉浮緊者。榮衛俱病也。麻黃湯中并用桂枝。此仲景之意也。至於青龍。雖治傷風見寒脉傷寒見風脉之病。然仲景云。汗出惡風者。不可服之。服之厥逆。便有筋惕肉瞤之證。故青龍一證。尤難用。須是形證諦當。然後可行。故王寔大夫證治。止用桂枝麻黃各半湯。蓋慎之也。

有人病傷寒。身熱頭痛。予診之曰。邪在表。此表實證也。當汗之。以麻黃湯。或人問曰。傷寒大抵因虛。故邪得以入之。今邪在表。何以云表實也。予曰。古人稱邪之所湊。其氣必虛留而不去。其病則實。蓋邪之入人也。始因虛。及邪居中。則反為實矣。大抵調治傷寒。先要明表裏虛實。能明此四字。則仲景三百九十七法可坐而定也。何以言之。有表實。有表虛。有裏實。有裏虛。有表裏俱實。有表裏俱虛。予於表裏虛實。歌中常論其事矣。仲景麻黃湯之類。為表實而設也。桂枝湯之類。為表虛而設也。裏實則承氣之類是也。裏虛則四逆之類是也。表裏俱實。所謂陽盛陰虛下之則愈。表裏俱虛。所謂陽虛陰盛汗之則愈也。常讀華他傳。有府吏倪尋李延共止。俱頭痛身熱。所苦正同。他曰。尋當下

利之。延當發汗。或難其異。他日尋外實。延內實。故治之異　許叔微傷寒九十論麻黃湯證。鄉人丘臣忠。寓毗陵薦福寺。病傷寒。予為診視。見其發熱頭疼煩渴。脉雖浮數無力。自尺以下不至。予曰。雖麻黃證。而尺遲弱。仲景云。尺中遲者榮氣不足。血氣微少。未可發汗。予於建中湯加當歸黃耆。令飲之。翌日病者不耐。其家曉夜督發汗藥。其言至不遜。予以鄉人隱忍之。但以建中調理而已。及六七日。尺部方應。遂投麻黃湯。啜第二服。狂言煩悶。須臾稍定。已中汗矣。五日愈。又論曰。仲景論雖云不避晨夜。即便治。醫者亦須顧其表裏虛實。待其時日。若不循次第。雖暫時得安。虧損五藏。以促壽限。何足尚哉。昔范雲為陳霸先屬官。霸先有九錫之命在旦夕矣。雲偶感寒疾。恐不及預盛事。召徐文伯診視之。懇便可得愈乎。文伯曰。便差甚易。後恐二年後不復起爾。雲曰。朝聞道夕死猶可。況二年乎。文伯以火燒地布桃柏葉。設席置雲卧其上。頃刻汗解。以溫粉裹之。翌日愈。雲甚喜。文伯曰。不足喜也。後二年果卒矣。夫取汗先期。尚促壽限。況不顧表裏。不待時日。便欲速愈乎。每見病家不耐病。三四日晝夜促汗。醫者顧利。恐別更醫。隨情順意。鮮不致斃。故予書此。以為龜鑑　李知先傷寒活人書括。論麻黃桂枝湯。服桂枝湯吐者。其後必吐膿血。出證治論。服麻黃湯發煩目瞑劇者必衄。出活人書。頭疼發熱汗出惡風。宜桂枝湯之類。應解散而用桂枝者。頭疼發熱無汗惡寒。宜麻黃湯之類。應解散而用麻黃者。二者均為解散。正分輕重。不可不察也。仲景云。無汗不得服桂枝。有汗不得服麻黃。古人有汗者當解肌。無汗者當發汗。　成無已傷寒明理論麻黃湯方。本草有曰。輕可去實。即麻黃葛根之屬是也。實謂寒邪在表。皮腠堅實。榮衛勝。津液內固之表實。非腹滿便難之內實也。聖濟經曰。汗不出而腠密。邪氣勝而中蘊。輕劑所以揚之。即麻黃葛根之輕劑耳。麻黃味甘苦。用以為君者。以麻黃為輕劑。而專主發散。是以為君也。桂枝為臣者。以風邪在表。又緩而膚理疎者。則必以桂枝解其肌。是用桂枝為臣。寒邪在經表實而腠密者。則非桂枝所能獨散。必專麻黃以發汗。是當麻黃為主。故麻黃為君。而桂枝所以為臣也。內經曰。寒淫于內。治以甘熱。佐以辛苦者。茲是類歟。甘草味甘平。杏仁味甘苦溫。用以為佐使者。內經曰。肝苦急。急食甘以緩之。肝者榮之主也。傷寒榮勝衛固。血脉不利。是專味甘之物以緩之。故以甘草杏仁為之佐使。且桂枝湯主中風。風則傷衛。風邪併於衛則衛實而榮弱。仲景所謂汗出惡風者。此為榮弱衛強者是矣。故桂枝湯佐以芍藥。用和榮也。麻黃湯主傷寒。寒則傷榮。寒邪併於榮。則榮實而衛

虛內經所謂氣之所并為血虛血之所并為氣虛者是矣故麻黃佐以杏仁用利氣也若是之論實處方之妙理制劑之淵微該通君子熟明察之乃見功焉　劉守眞病機氣宜保命集解利傷寒論夫傷寒之法先言表裏及有緩急三陽表當急裏當緩三陰表當緩裏當急又曰脉浮當汗脉沉當下脉浮汗急而下緩謂三陽表也脉沉下急而汗緩謂三陰表也麻黃湯謂之急麻黃附子細辛湯謂之緩內經云有漬形以為汗為汗之緩裏之表也又曰在皮者汗而發之為汗之急表之表也急汗者太陽緩汗者少陰是藏府之輸應也假令麻黃附子細辛湯是少陰證始同發熱脉沉裏和無汗故漬形以為汗也假令麻黃湯是太陽證頭項痛腰脊強脉浮無汗裏和是也在皮者汗而發之也經曰治主以緩治客以急此之謂也假令得肝脉其外證善潔面青善怒其三部脉俱弦而浮表寒裏和謂清便自調也麻黃湯內加羌活防風各三錢謂脉主風是膽受病大便祕或泄下赤水無數皆裏不和也假令得心脉其外證面赤口乾善咲其尺寸脉俱浮而洪惡寒裏和清便自調也麻黃湯內加黃芩石膏各三錢謂心主熱是小腸受病也假令得脾脉其外證面黃善噫善思善味尺寸脉俱浮而緩裏和惡寒麻黃湯內加白术防己各五錢謂脾主濕胃經受病也假令得肺脉其外證面白善嚏悲愁不樂欲哭其尺寸脉俱浮而濇裏和惡寒麻黃湯內加桂枝生薑各三錢謂肺主燥是大腸受病也假令得緊脉其外證面黑善恐其尺寸脉俱浮而裏和惡寒麻黃湯內加附子生薑謂腎主寒是膀胱經受病也已上五證皆表之表謂在皮者急汗而發之皆府受病表之裏者下之當緩謂隨藏表證外顯尺寸脉俱浮而復有裏證謂發熱飲水便利赤澀或瀉下赤水按之內實或痛麻黃湯去麻黃杏仁與隨藏元加藥同煎作五服每下一證初一服加大黃半錢邪盡則止未盡第二服加大黃一錢邪未盡加大黃一錢半如邪未盡又加之邪盡則止此謂先緩而後急是表之裏證下之當緩也假令得肝脉其內證四肢滿閉淋溲便難轉筋其寸尺脉俱沉而弦裏和惡寒肝經受病麻黃附子細辛湯內加羌活防風各三錢假令得心脉其內證煩心心痛掌中熱而噦其尺寸脉俱沉裏和惡寒心經受病湯內加黃芩石膏各三錢假令得脾脉其內證腹脹滿食不消怠惰嗜卧其尺寸脉俱沉裏和惡寒脾經受病加白术防己各三錢假令得肺脉其內證喘咳洒淅寒熱其尺寸脉俱沉裏和惡寒肺經受病加薑桂各三錢假令得腎脉其內證泄而下重足脛冷而逆其脉尺寸俱沉腎經受病加附子生薑各三錢已上五證

裏之表也。宜漬形以為汗。皆藏受病也。裏之裏者。下之當急。謂隨藏內證已顯。尺寸俱沉。復有裏證者。謂大小便閉澀。或下赤水。或瀉無數。不能飲食。不惡風寒發熱。引飲。其脉俱沉。或按之內實而痛。此謂裏實。宜速下之。麻黃附子細辛湯內去麻黃。與隨藏元加藥內分作三服。每下一證。初一服加大黃三錢。邪盡則止。如邪未盡。再一服加大黃二錢。又未盡第三服加大黃一錢。此先急而後緩。謂是裏之裏也。當速下之也　劉守眞傷寒直格論傷寒表證。夫傷寒之候。頭項痛腰脊強。身體拘急。表熱惡寒。不煩躁無自汗。或頭面目痛。肌熱鼻乾。或胷滿而喘。手足指末微厥。脉浮數。而緊者。邪熱在表。此皆麻黃湯發汗之證也。或天水散之類甚佳。無使藥不中効而益加害也。益元散　一名天水散。　一名太白散。治身熱嘔吐泄瀉。腸澼下痢赤白。治淋閟癃閟疼痛。利小府偏主石淋。蕩胷中積聚寒熱。大益精氣。通九竅六府津液。去留結。消畜水。止渴利中。除煩熱心躁。治腹脹痛悶。補益五藏。大養脾腎之氣。此腎水之藏。非胃土之府也。理內傷陰痿。安魂定魄。補五勞七傷。一切虛損。主瘧瘵驚悸。健忘。止煩滿短氣。藏傷咳嗽。療飲食不下。肌肉疼痛。治口瘡牙齒疳蝕。明耳目。壯筋骨。通經脉。和氣血。消水穀。保眞元。解百藥酒食邪熱毒。耐勞役。飢渴寒熱。辟中外諸邪所傷。久服強志輕身。駐顏益壽。及解中暑傷寒疫癘。飢飽勞損。憂愁思慮。恚怒驚恐。傳染。并汗後遺熱勞復諸疾。兼解兩感傷寒。能令遍身結滯宣通氣和而愈。及婦人下乳催生。并產後損液血虛。陰虛熱甚。一切諸證。並宜服之。兼患吹乳乳發。或已覺吹乳乳癰。頓服即愈。迺神驗之仙藥也。石淋服金石熱藥。結為砂石。自小便中出。痛不可忍。益元散　滑石六兩。白膩好者　甘草一兩。　右為細末。每服三錢。蜜少許。溫水調下。或無蜜亦可。每時日三服。或欲冷飲者。新井泉調下亦得。解利發汗。煎蔥白豆豉湯下。每服水一盞。蔥白五寸。豆豉五十粒。煑取汁七分。調併三四服。以効為度。此藥是寒涼解散熱鬱。設病甚不解。多服無害。但有益耳。本世傳名太白散。俗惡性寒。忽易得之賤物。而又不明素問造化之理。故不取本草神驗之言。而多不用焉。若以隨證驗之。乃凡人之仙藥也。何可缺歟。夫傷寒當汗則不可下。當下則不可汗。且如誤服此藥。則汗自不出。而裏熱亦獲其効。亦有裏熱便得宣通而愈者也。或半在表半在裏。可和解而不可吐下發汗者。若服此藥多愈。或不愈亦小減。加涼膈散和解尤佳。或自當汗解者。更加蒼朮廉末三錢。同蔥豉煎湯調服尤良。或孕婦不宜滑石。麻黃桂枝等發汗。即用甘草一兩。蒼朮二兩。同為廉末。每服四錢。水一盞。蔥白

五寸。豉五十粒。同煎至六分。濾去滓熱服。併二三服取微汗。是名逼毒散。非孕婦亦可服。或太白散加麻黃二兩去節煎服。世云神白散。或逼毒散加麻黃與蒼朮等。分去節。濟衆云青龍散。或青龍散更加滑石末。與蒼朮二倍。是為發汗之妙藥。名曰大逼毒散。此方唯正可汗者即用。誤服之則轉加熱也。或解利兩感。煎涼膈散調下。益元散四錢。或下乳用猪肉麪羹或粥飲之類調下四錢。不拘時候。日三服。及宜食肉麪羹粥。催產溫香油漿調下五錢。并二三服。以產為度。或死胎不下者。煎三乙承氣湯一服。調下益元散五錢。須臾更頻用油漿調益元散溫服。前後俱下。而胎下可活產母也。凡難產或死胎不下。皆由風熱燥澀緊斂結滯而不能舒緩。故產戶不得自然開通也。此藥力至則結滯頓開而產矣。後慎不可溫補。而反生燥熱也。俗未知產後亡液損血。疼痛怖懼。以致神狂氣亂。則陰氣損虛。邪熱大甚。而為諸熱證。由不讀素問。不知造化。故不識證候陰陽。反以妄為產後諸虛百損。便為虛冷而無熱也。誤以熱藥溫補。或見煩渴者。不令飲水。本雖善心。為害多矣。豈知治病之道。但以臨時審其藏府六氣虛實。明其標本。如法治之而已矣。此藥泛常多用。然雖為効至大。而俗以病異藥同。將謂妄行。反招侮慢。今以黃丹加令桃紅色。名曰紅玉散。加青黛令輕碧色。名碧玉散。加薄荷葉一分。名雞蘇散。主療不殊。收効則一。俗目懵然。何能別此。可遠妄侮。可顯玄功。後之學者。其究心焉。雙解散。普解風寒暑濕。肌飽勞逸。憂愁思慮。恚怒悲恐。四時中外諸邪所傷。但覺身熱頭疼。拘倦強痛。無問自汗無汗。憎寒發熱。渴與不渴。有甚傷寒疫癘。汗病兩感。風氣雜病。一切舊病作發。三日裏外。並宜服之。設若感之勢甚。本難解者。常服三兩日間。亦漸減可。並無所損。或裏熱極甚。腹滿而痛。煩渴譫妄。須可急下者。以大承氣湯下之。三乙承氣湯亦妙也。或下後未愈。或證未全。或大汗前後逆氣。或汗後餘熱不解。或遺熱勞復。或感他人病氣。汗毒傳染。或中瘴氣馬氣羊氣。一切穢毒。并漆毒酒毒。食一切藥毒。及墜墮打撲傷損疼痛。或久新風眩頭疼。中風偏枯。破傷風。洗頭風。風癇病。或婦人產後諸疾。小兒驚風。風積熱。瘡瘍疹痘諸證。無問日數。但服之周身中外氣血宣通。病皆除愈。是防風通聖散。加天水散各一半。

防風　川芎　當歸　切焙　芍藥　薄荷葉淨　大黃　麻黃去根苗節　連翹　芒消別研各半兩　石膏別研　桔梗各一兩　滑石十五兩別研　白朮　山梔子　荊芥穗　甘草四兩剉爁　黃芩各一分

右為麄末。每服用五六錢。水一大盞半。入葱白五寸。鹽豉五十粒。生薑三片。煎至一盞。濾汁去滓

温服無時。日三四服。以効為度。常服三錢。水一中盞。煎六分。絞汁温服。不拘時。兼夜四服。設痊愈後。更宜常服。使病不再作。新病不生。並無過竟。無問歲數。乃平人常服之仙藥也。凡人已衰老。則腎水真陰損虛。即風熱燥鬱甚。精血涸竭枯燥而死。但宜此藥扶補滋潤者也。嗟夫世俗反以妄傳中年已上。火氣漸衰。止是虛冷。更無熱病。誤服熱毒之劑。害人無數。豈知識病之法。全憑脉證。以別寒熱陰陽虛實。豈可以中年上下為則耶。此藥除孕婦及產後月事經水過多。并泄瀉者不宜服。或治雜病。亦宜治風熱極妙。一名通氣防風散。一名通解散。　張子和治法心要。論雙解。劉守真製雙解散。益元散各七八錢。入生薑葱白同煎。解傷寒三二日間。以其傷寒初覺。亦傷寒起。傷寒疑似之間。解表則恐傷於內。攻裏則恐傷於外。故製雙解表裏。齊見俱解。甚為得法。然有不解者。猶未盡善也。子和增作吐法。亦同上藥一椀。先服一半。探引吐出風痰。次服一半。仍用酸辣湯投之。使近火衣被蒙蓋。汗則十解八九。此法子和得之規矩準繩之外。世所未知也。世人止知桂枝湯麻黃湯能汗。獨不知涼藥之能汗。又盡善也。熱藥汗或不發。反益其病。涼藥發之。百無損矣。素問曰。辛甘發散為陽。白粥配葱食之。便能發汗。益元加薄荷亦然。承氣用生薑棗。以其辛甘發散之意。

劉守真雙解。子和演為吐法。豈非涼藥亦能發汗。　雲岐子保命集。太陽摽病。身熱頭痛。項背強。身疼惡風。是寒則傷榮。脉浮而緊。表實無汗而喘者。宜麻黃湯。太陽尺寸脉俱浮。脉從標本。桂枝主衛而在表。故風則傷衛。衛者氣也。氣從於表。太陽行身之後。故先用桂枝。寒則傷榮。榮者血也。血為有形之說。血近於經。經有始終。榮衛營周不息。豈有止也。寒邪傷榮。脉浮而緊。身熱惡寒。頭項痛而無汗。故終始者為經。以身熱者為表。以浮者為摽。故太陽病先桂枝。次麻黃。麻黃為鴻表之實。　李憲德生堂經驗方云。麻黃湯夏月加黃芩。升麻。柴胡煎。　蘭室寶鑑。脉經曰。寸口脉緊。苦頭痛。宜麻黃湯。針眉衝顳顬。

麻黃湯方

麻黃三兩。味甘温。去節　桂枝二兩。去皮。味辛熱

甘草一兩炙。味甘平　杏仁七十箇。湯去皮尖。味辛温

內經曰。寒淫於內。治以甘熱。佐以苦辛。麻黃甘草開肌發汗。桂枝杏仁散寒下氣。

右四味以水九升。先煑麻黃減二升。去上沫。內諸藥煑取二升半。去滓温服八合。覆取微似汗。不須啜粥。餘如桂枝法將息。王燾外臺秘

要方忌海藻菘菜生葱。按張仲景傷寒論云麻黃湯惟主傷寒不主中風若中風但可服前桂枝湯。

太陽與陽明合病喘而胷滿者不可下宜麻黃湯主之。成無已註陽受氣於胷中喘而胷滿者陽氣不宣發壅而逆也心下滿腹滿皆為實當下之此以為胷滿非裏實故不可下雖有陽明然與太陽合病為屬表是與麻黃湯發汗。許叔微普濟本事方治太陽陽明合病麻黃湯有人病傷寒脉浮而長喘而胷滿身熱頭痛腰脊強鼻乾不得眠予曰太陽陽明合病證仲景法中有三證下利者葛根湯不下利嘔逆者加半夏喘而胷滿者麻黃湯也治以麻黃得解有人問傷寒傳入之序自太陽陽明少陽太陰少陰厥陰所傳有次第何哉予曰仲景本論無說古今亦無言者惟龐安常謂陽主生故太陽水傳足陽明土土傳足少陽木為微邪陰主殺故足少陽木傳足太陰土土傳足少陰水水傳足厥陰木為賊邪予以為不然足少陰水傳厥陰木安得為賊邪蓋牽強傳會失之穿鑿胡不觀素問陰陽離合論云太陽根起於至陰名曰陰中之陽陽明根起於厲兌名曰陰中之陽少陽根起於竅陰名曰陰中之少陽太陰根起於隱白名曰陰中之少陰少陰根起於湧泉名曰陰中之少陰厥陰根起於大敦名曰陰中之絕陰故其次序正與此合大抵傷寒始因中風寒得之於陰是以止傳足經者皆陰中之陽陰中之陰也不特此也以六氣在天者考之厥陰為初之氣少陰為二之氣太陰為三之氣少陽為四之氣陽明為五之氣太陽為終之氣此順也逆而言之太陽而後陽明陽明而後少陽少陽而後太陰太陰而後少陰少陰而後厥陰傷寒為病逆而非順故以是為序也雲岐子保命集太陽摽病頭痛身熱合陽明摽發熱不惡風而反惡熱脉浮而長喘而胷滿不可下當從脉浮而治以麻黃湯解表從太陽也太陽病十日以去脉浮細而嗜卧者外已解也設胷滿脇痛者與小柴胡湯脉但浮者與麻黃湯成無已註十日以去向解之時也脉浮細而嗜卧者表邪已罷也病雖已和解之若脉但浮而不細者則邪氣但在表也與麻黃湯發散之龐安時傷寒總病論云病十日以上脉浮細嗜卧者為已安候小柴胡和之細而遲者勿與雲岐子保命集太陽病頭痛項背強十餘日不解脉浮而細胷中滿脇痛者太陽少陽併病與小柴胡湯如脉浮而不細反緊者宜麻黃湯太陽中風脉浮緊發熱惡寒身疼痛不汗出而煩躁者大青龍湯主之若脉微弱汗出惡風者不可服服之則厥逆筋惕肉瞤此為逆也大青龍湯主之成無已註此中風見寒脉也浮則為風風

則傷衛。緊則為寒。寒則傷榮。榮衛俱病。故發熱惡寒身疼痛也。風并於衛者。為榮弱衛強。寒并於榮者。為榮強衛弱。今風寒兩傷。則榮衛俱實。故不汗出而煩躁也。與大青龍湯發汗。以除榮衛風寒。若脉微弱汗出惡風者。為榮衛俱虛。反服青龍湯。則必亡陽。故生厥逆。筋惕肉瞤。此治之逆也。

朱肱傷寒活人書問。有發熱惡寒煩躁手足溫。而脉反浮緊者。有寒多熱少。不煩躁。手足微冷。而脉反浮緩。答曰。此名傷風見寒脉。傷寒見風脉也。蓋發熱惡風煩躁手足溫。為中風候。脉浮緊為傷寒脉。是中風見寒脉也。寒多熱少不煩躁。手足微厥為傷寒候。脉浮緩為中風脉。是傷寒見風脉也。中風見寒脉。傷寒見風脉。宜服大青龍湯。蓋大青龍證。脉似桂枝反無汗。病似麻黃反煩躁是也。脉弱有汗。為桂枝證。脉緊不煩躁。為麻黃證。大青龍湯治病與麻黃湯證相犯。但病尤重。而又加煩躁者。用大青龍湯也。以其中風并傷寒俱盛。故青龍湯添麻黃作六兩。又似合桂枝湯藥味在內。添石膏。所以為緊。此治榮衛俱病。若證不審。誤入大青龍湯。則發汗多傷人。以其有煩躁一證。故可用大青龍。大抵感外風者為傷風。感寒冷者為傷寒。故風則傷衛。寒則傷榮。桂枝主傷衛。麻黃主傷榮。大青龍主榮衛俱傷故也。風傷衛者。病在皮膚之間也。以衛行脉外為陽。主外皮膚之間衛氣之道路故也。其病淺。寒傷榮者。寒氣中於肌肉也。以榮行脉中為陰主內。肌肉之間。榮氣之道路故也。其病深。所以桂枝與麻黃所施各異。戒勿誤用。以有淺深之別。風寒之殊。大醫當宜審諦。大青龍尤宜慎用。仲景云。脉微弱。汗出惡風者。不可服青龍。服之則厥逆。筋惕肉瞤。此逆也。類纂云。凡發汗過多。筋惕肉瞤。振振搖動。或虛羸人微汗出便有此證。俱宜服眞武湯以救之。羸甚者去芍藥。或量多少與之。惡熱藥者去附子。餘依加減法。仲景製眞武湯。若調理順者無此證。

許叔微傷寒九十論大青龍湯證。一何保義。從太尉軍中得傷寒。脉浮濇而緊。予曰。若頭疼發熱惡風無汗。則麻黃證也。加煩躁則大青龍證也。何曰。目今煩躁甚。予投以大青龍。三投而汗解。論曰。桂枝麻黃青龍皆表證發汗藥。而桂枝治汗出惡風。麻黃治無汗惡寒。青龍治無汗而煩躁。三者皆欲微汗解。若汗多亡陽而虛。則煩躁而不得眠也。李知先傷寒活人書括論大青龍湯。大青龍證。脉似桂枝反無汗。病似麻黃反煩躁是也。脉弱有汗。為桂枝證。脉緊不煩躁。為麻黃證。大青龍湯治病與麻黃湯證相似。但病尤重。而又加煩躁者。用大青龍湯也。以其中風并傷寒。故青龍湯添麻黃。又合以桂枝湯藥味。在內更加石膏。所以為緊。此治榮衛俱病。若證不審。誤用大青龍湯。則

發汗多傷人。以其有煩躁一辭。故可用大青龍也。大抵感外風者為傷風感寒冷者為傷寒。故風則傷衛。寒則傷榮。桂枝主傷衛。麻黃主傷榮。大青龍主榮衛俱傷也。風傷衛者。病在皮膚之間也。以衛行脉外為陽主外。皮膚之間。衛氣之道路故也。其病淺。寒傷榮者。寒氣中於肌肉也。以榮行脉中。為陰主內。肌肉之間。榮氣之道路故也。其病深。所以桂枝與麻黃所施各異。戒勿誤用。以有淺深之別。風寒之殊。大醫當宜審諦。大青龍尤宜戒用。仲景云。脉微弱汗出惡風者。不可服青龍。服之則厥逆筋惕肉瞤。此為逆也。宜服真武湯。仲景特設此藥以救之。 成無已傷寒明理論大青龍湯方。青龍東方甲乙木神也。應春而主肝。專發生之令為數榮之主。萬物出甲開。甲則有兩岐。肝有兩葉。以應木葉。所以謂之青龍。以發散榮衛兩傷之邪。是應肝木之體耳。桂枝湯主中風。麻黃湯主傷寒。二者發散之純者也。及乎大青龍湯則不然。雖為發汗之劑。而所主又不一。必也中風脉浮緊。為中風。見寒脉。是風寒兩傷也。傷寒脉浮緩。為傷寒。見風脉。是風寒兩傷也。風無寒。寒無風。乃大青龍湯專主之也。見茲脉證。雖欲與桂枝湯解肌以祛風。而不能已其寒。則病不去。或欲以麻黃湯發汗以散寒。而不能去其風。則病仍在。茲仲景所以特處大青龍湯以兩解之。麻黃味甘溫桂枝味辛熱。寒則傷榮。必以甘發之。風則傷衛。必以辛散之。此風寒兩傷榮衛俱病。故以甘辛相合。而為發散之劑。表虛膚緩者。則以桂枝為主。此以表實腠理密。則以麻黃為主。是先麻黃後桂枝。茲麻黃為君。桂枝為臣也。甘草味甘平。杏仁味甘苦。苦甘為助。佐麻黃以發表。大棗味甘溫。生薑味辛溫。辛甘相合。佐桂枝以解肌。石膏味甘辛微寒。風陽邪也。寒陰邪也。風則傷陽。寒則傷陰。榮衛陰陽。為風寒兩傷。則非輕劑所能獨散也。必須輕重之劑以同散之。乃得陰陽之邪俱已。榮衛之氣俱和。是以石膏為使。石膏為重劑。而又專達肌表者也。大青龍湯發汗之重劑也。非桂枝湯之所同。用之稍過。則又有亡陽之失。經曰。若脉微弱汗出惡風者。不可服。服之則厥逆筋惕肉瞤。此為逆也。又曰。一服汗者。停後服。若復服。汗多亡陽遂虛。惡風煩躁不得眠也。即此觀之。劑之輕重可見矣。其用湯者。宜詳審之。 又溫粉方 白朮 藁本 川芎 白芷各等分 右搗羅為細末。每末一兩。入米粉三兩和。冷勻。粉撲周身止汗。無藁本亦得 楊仁齋直指方云。傷風見寒脉。傷寒見風脉。為榮衛俱受邪。用大青龍湯。然大青龍不可輕用。須是風寒俱盛。又加煩躁一證。方可與之。叙易簡者謂二證交攻。則桂枝麻黃湯兼用。尤為穩當 劉守真傷寒直格論俱中風寒。頸項

痛。肢體疼。手足溫。為中風也。反無汗惡寒。脉浮緊者為傷寒也。或頭項痛。腰脊強。身體拘急。指末微厥。不自汗。為傷寒也。反煩躁而脉緩者為傷風也。風則傷衛。而寒則傷榮。萬物必以陰求陽。陽求陰。陰陽相應。則為和平。故榮者陰氣也。寒加之則傷耳。故又曰寒傷血。血亦陰也。衛陽氣也。風亦陽也。故風加之則傷耳。故曰熱傷氣。氣為陽也。經言陰寒主於閉藏。而陽熱主於開泄。故寒傷榮。則腠理閉密。怫熱內則躁熱而無汗。故脉數浮而緊也。風傷衛。則腠理開泄而自汗也。故脉浮而緩。以邪熱泄越。故脉不能實。陽明主於肌肉。故自汗多而脉反遲也。熱乃陽中之至陽。故傷熱氣。則大汗自出。病雖為熱。脉不能實而虛弱也。然怫熱否閉無汗者。故當病也。其汗泄通泰而亦病者。蓋泰極則否也。夫人氣和而為汗。如天地氣和而為雨。過多則澇。久不雨則旱。有無多少。貴乎應時。興衰失常。則災害至矣。萬事皆然。雲岐子保命集。傷寒六經。以太陽為始。故背為外。腹為內。背主表。腹主裏。太陽行身之後。為諸陽之表。風寒中人。先傷於表。故外而之內。邪中衛者桂枝。中榮者麻黃。在肌者葛根。在筋者青龍。去葛根而加石膏。便為大青龍。無水者不用。因水而用之也。太陽經中風。頭痛項強。脉浮而緊。發熱中風。脉當得緩。自汗出。今反浮緊無汗而煩躁。可解表。宜大青龍湯。

王好古醫壘元戎云。傷寒得傷風脉。傷風得傷寒脉。故仲景有大青龍之劑。及汗出過多戒不可服。有筋惕肉瞤之證。許公學士諄諄以此。則知麻黃桂枝不可輕用也。及淇川韓氏又有桂枝之戒。以其治亂貴賤之不同。芳草虀鹽之不等故耳。至於楊氏明理。特有互見脉體。非精於持診者。則未易能之。後之學者。安所適從哉。故先師潔古老人博採衆方。別立一法。作十味大羌活湯。無問有汗無汗。中風中寒。悉皆治之。使喜溫者去五積之變熱。好涼者除雙解之變寒。雖市夫農子用之而無失。自非聖賢之前身。豈能下筆。有此胷次耶。東垣先生云。治傷風得傷寒脉。傷寒得傷風脉。證與脉不同。故各半湯。桂枝二麻黃一湯。桂枝二越婢一湯。麻黃杏仁甘草石膏湯。大青龍湯。去桂。是海藏老餘證辨并藥。傷風脉緊。仲景大青龍湯主之。無汗惡風。仲景葛根湯主之。已上二證。傷風得傷寒脉。傷寒得傷風脉是也。易老斷為桂枝麻黃各半兩。

大青龍湯方

麻黃 六兩去節。味甘溫　桂枝 二兩去皮。味甘熱

甘草 二兩炙。味甘平　杏仁 四十箇去皮尖。味苦甘溫

生薑 三兩切。味辛溫　大棗 十二枚擘。味甘溫

石膏如鷄子大碎。味甘微寒
辛甘均為發散。然風宜辛散。寒宜甘發。辛甘相合。乃能發散榮衛之
風寒。麻黃。甘草。石膏。杏仁。以發散榮中之寒。桂枝。薑。棗。以解除衛中
之風。

右七味以水九升。先煑麻黃減二升。去上沫。內諸藥。煮取三升。去滓
溫服一升。取微似汗。汗出多者。溫粉粉之。一服汗者。停後服。汗多亡
陽遂虛。惡風煩躁不得眠也。王燾外臺秘要方云。忌海藻菘菜生葱
等物。

傷寒脉浮緩。身不疼。但重。乍有輕時。無少陰證者。大青龍湯發之。成無已
註。此傷寒見風脉也。傷寒者身疼。此以風勝。故身不疼。中風者身輕。此以
無風。故乍有輕時。不久厥吐利。無少陰裏證者。為風寒外甚也。與大青龍
湯以發散表中風寒。龐安時傷寒總病論云。少陰當言太陰。按太陰證
內有脉浮緩。手足溫者。繫太陰。太陰當發黃。證屬青龍湯。似桂枝湯證反
無汗而脉緊。似麻黃證反身不疼而脉浮緩。陳無擇三因方料簡論曰。
有汗不得服麻黃。無汗不得服桂枝。切忌不得悞。若寒證見風脉。却以麻
黃桂枝各半湯。古人治傷風熱多寒少。惡風脉浮緊。無汗用青龍湯。蓋先

傷風而後傷寒。風證尚在而寒脉已行。故有是備也。若先傷寒而後傷風。
寒多熱少。不煩躁微厥。脉當浮緩弱而自汗。即傷寒見風脉。但青龍緊暴。
不若各半湯平和無悔吝也。諸經皆倣此。汪疇傷寒發明書經曰。傷寒
脉浮緩身不疼。但重乍有輕時。無少陰證者。大青龍湯主之。按此條與前
藥不汗出煩躁證成註合而論之。以前條為傷風見寒脉。以此條為傷寒
見風脉。同大青龍湯為治。活人書皆祖述之。然以上條詳之。恐不可輕用。
或論文傳悞前條中風字。是傷寒悞作中風耳。而此條決非大青龍湯也。

傷寒表不解。心下有水氣。乾嘔發熱而欬。或渴。或利。或噎。或小便不利。少
腹滿或喘者。小青龍湯主之。林億等校正云。謹按小青龍湯大要治水。又
按本草荛花下十二水。若水去利則止也。又按千金形腫者應內麻黃。乃
內杏仁者。以麻黃發其陽故也。以此證之。豈非仲景意也。成無已註云。傷
寒表不解。心下有水。飲則水寒相搏。肺寒氣逆。故乾嘔發熱而欬。針經曰。
形寒飲冷則傷肺。以其兩寒相感。中外皆傷。故氣逆而上行。此之謂也。與
小青龍湯發汗散水。水氣內漬。則所傳不一。故有或為之證。隨證增損以
解化之。和劑局方小青龍湯。治傷寒表不解。心下有水。乾嘔發熱。欬嗽
微喘。又治溢飲。身體疼重。及欬逆倚息。不得安卧。或因形寒飲冷。內傷肺

經。咳嗽喘急。嘔吐涎沫。茲宜服之。成無己傷寒明理論小青龍湯方。青龍象肝木之兩岐。而主兩傷之疾。中風見寒脉。傷寒見風脉。則為榮衛之兩傷。故以青龍湯主之。傷寒表不解。則麻黃湯可以發。中風表不解。則桂枝可以散。惟其表且不解。而又加之心下有水氣。則非麻黃湯所能發。桂枝湯所能散。乃須小青龍湯。始可祛除表實之邪氣耳。麻黃味甘辛溫。為發散之主。表不解應發散之。則以麻黃為君。桂味辛熱。甘草味甘平。甘辛為陽。佐麻黃表散之用。二者所以為臣。芍藥味酸微寒。五味子味酸溫。二者所以為佐者。寒飲傷肺。咳逆而喘。則肺氣逆。內經曰。肺欲收。急食酸以收之。故用芍藥五味子為佐。以收逆氣。乾薑味辛熱。細辛味辛熱。半夏味辛微溫。三者所以為使者。心下有水。津液不行。則腎氣燥。內經曰。腎苦燥急食辛以潤之。是以乾薑細辛半夏為使。以散寒水。逆氣收。寒水散。津液通行。汗出而解矣。心下有水氣散行。則傳不一。故又增損之證。若渴者去半夏加栝蔞根。水畜則津液不行。氣燥而渴。半夏味辛溫。燥津液者也。去之則津液易復。栝蔞根味苦微寒。潤枯燥者也。加之則津液通行。是為渴所宜也。若微利去麻黃加荛花。水氣下行。漬入腸間。則為利。下利者不可攻其表。汗出必脹滿。麻黃專為表散。非下利所宜。故去之。荛花味苦寒酸苦。為湧泄之劑。水去利則止。荛花下水。故加之。若噎者去麻黃加附子。經曰。水得寒氣。冷必相搏。其人即噎。又曰病人有寒復發汗。胃中冷必吐蚘。噎為胃氣虛竭。麻黃發汗。非胃虛冷所宜。故去之。附子辛熱。熱則溫其氣。辛則散其寒。而噎者為當。兩相佐之。是以祛散冷寒之氣。若小便不利。少腹滿。去麻黃加茯苓。水畜在下。焦不行。為小便不利。少腹滿。凡邪客於體者。在外者可汗之。在內者可下之。在上者可湧之。在下者可泄之。水畜下焦。滲泄可也。發汗則非所當。故去麻黃。而茯苓味甘淡。專行津液。內經曰。濕淫於內。以淡滲之。滲溺行水。甘淡為所宜。故加茯苓。若喘者去麻黃加杏仁。喘為氣逆。麻黃發陽。去之則氣易順。杏仁味甘苦溫。加之以泄逆氣。金匱要畧曰。其形腫者。故不內麻黃。乃內杏子。以麻黃發其陽。故喘逆形腫。標本之疾。加減所同。蓋其類矣。　十便良方小青龍湯。若其狀洒淅惡寒。但欲厚衣近火。陽。頭重時痛。鼻窒塞。濁涕如膿。痰動輒汗出。亦或無汗。甚則戰慄。此由寒邪之氣。從外入中。或因飲冷客於肺經。內外合邪。留於經絡。謂之感寒。寒從外至。則兩手寸口脉俱緊。或寒從內起。其脉帶遲。惡寒無汗者。　劉守真傷寒直格云。小青龍湯治傷寒表未罷。心下有水氣。表雖未罷。而已有熱入於裏。怫鬱於胃。則飲食水液不能傳化宣行。畜積

不散而為此。非裏熱大實煩渴引飲過多。停積而為病者。乾嘔發熱而欬。或渴。或利。或噎。或小便不利。少腹滿或喘者。水不浸潤宣散。滋潤腸胃藏府故熱而渴。或噎。或喘。或小腑不利。少腹滿而喘也。水液不能宣行。則濕熱甚於腸胃。故或利也。此方主溫散其水。以潤腸胃藏府之燥。以開發中外之怫熱結滯者也。　雲岐子保命集。太陽經病身熱頭痛惡風。脉浮而滑。表不解。心下有水氣而嘔噦者。小青龍主之。心下有水氣。加細辛乾薑辛而散水。五味子酸收而止渴。故宜小青龍湯。　太陽經病頭痛身熱惡風。因飲水而欬者。邪在於表。因飲水而不消。形寒飲冷則傷肺。故微喘脉浮而緊。宜小青龍湯。　太陽經病頭痛項強。腰脊強。脉浮而緊。是傷寒也。法當解表。反飲冷水。內無邪熱。不能勝水。故停心下。乾嘔而欬。或渴。或噎。水停心下。或利。水氣逆上。或小便不利。膀胱受濕。或喘。傷肺。宜小青龍湯。凡病表裏傷寒。而口乾。引飲。水氣在內。停而不散。外有表証未除。內有水者。小青龍湯主之。　王好古醫壘元戎論小青龍湯後人增損為華蓋散。大青龍去桂石膏。倍加杏仁治嗽。又云。病溢飲者當發其汗。小青龍湯主之。　尚從善傷寒紀玄妙用集論小青龍湯。傷寒欬嗽。欬逆。倚息不得卧。二證之外。加減者六。兼治者四。其湯下後加減。以治變證者。又有四焉。此仲景治法。要明其理。不可不知。非特治傷寒為然。金匱治溢飲肺癰。婦人霍亂嘔逆吐涎沫者是也。信乎小青龍治咳嗽。曲盡其法矣。　吳恕傷寒指掌圖云。水為至陰。其性則寒。病有內熱。得水則消爍之。若身熱內寒。得水則兩寒相搏。故水停心下。用小青龍湯。以乾薑細辛半夏之辛行其水也。餘如茯苓等劑。取其能下畜水。若水結在胷。但頭汗出。徧身無汗。是水飲不得外泄。用陷胷湯下之。少陰內寒。必當溫也。　蘭室寶鑑胡氏云。凡傷寒水氣。皆因飲水過多所致。水停心下。氣上乘心。則為悸為喘。結於胷脇。則為結胷。冷氣相搏。則為噎。上迫於肺。則為欬。漬入腸中。則為下利。邪熱所薄。蓄於下焦。則為小便不利。少腹滿。或裏急。溢於皮膚。則為腫。舉類而索之。無所不得矣。大抵療水氣法。病在陽。則小青龍湯。病在陰。則玄武主之也。

小青龍湯方

麻黃三兩去節。味甘溫　芍藥三兩。味酸微寒
五味子半升。味酸溫　乾薑三兩。味辛熱
甘草三兩炙。味甘平　細辛三兩。味辛溫
桂枝三兩去皮。味辛熱　半夏半升湯洗。味辛微溫

寒邪在表非甘辛不能散之麻黃桂枝甘草之辛甘以發散表邪水停心下而不行則腎氣燥內經曰腎苦燥急食辛以潤之乾薑細辛半夏之辛以行水氣而潤腎欬逆而喘則肺氣逆內經曰肺欲收急食酸以收之芍藥五味子之酸以收逆氣而安肺

右八味以水一斗先煮麻黃減二升去上沫內諸藥煮取三升去滓溫服一升成無已註加減法若微利者去麻黃加荛花如雞子熬令赤色下利者不可攻其表汗出必脹滿麻黃發其陽水漬入胃必作利荛花下十二水水去利則止若渴者去半夏加栝蔞根三兩辛燥而苦潤半夏辛而燥津液非渴者所宜故去之栝蔞味苦而生津液故加之若噎者去麻黃加附子一枚炮經曰水得寒氣冷必相搏其人即噎加附子溫散水寒病人有寒復發汗胃中冷必吐蚘去麻黃惡發汗若小便不利少腹滿去麻黃加茯苓四兩水畜下焦不行為小便不利少腹滿麻黃發津液於外非所宜也茯苓泄畜水於下加所當也若喘者去麻黃加杏仁半升去皮尖金匱要畧曰其人形腫故不內麻黃內杏仁以麻黃發其陽故也喘呼形腫水氣標本之疾

龐安時傷寒總病論

云如無荛花以桃花一鴨子大不炒代之

傷寒心下有水氣欬而微喘發熱不渴服湯已渴者此寒去欲解也小青龍湯主之成無已註欬而微喘者水寒射肺也發熱不渴者表證未罷也與小青龍湯發表散水服湯已渴者裏氣溫水氣散為欲解也太陽病外證未解脉浮弱者當以汗解宜桂枝湯成無已註脉浮弱者榮弱衛強也雲岐子保命集太陽經病外證未解脉浮弱者為陽弱者為陰法當自汗故宜桂枝湯太陽病下之微喘者表未解故也桂枝加厚朴杏仁湯主之成無已註下後大喘則為裏氣大虛邪氣傳裏正氣將脫也下後微喘則為裏氣上逆邪不能傳裏猶在表也與桂枝湯以解外加厚朴杏仁以下逆氣孫思邈千金翼方云宜桂枝湯一云麻黃湯許叔微普濟本事方戊申正月有一武臣為寇所執置舟中橫板下數日得脫乘飢恣食良久解衣捫虱次日遂作傷寒自汗而膈不利一醫作傷寒而下之一醫作解衣中邪而汗之雜治數日漸覺昏困上喘息高醫者愴惶失措予診之曰太陽病下之表未解微喘者桂枝加厚朴杏仁湯此仲景之法也指令醫者急治藥一啜喘定再啜漐漐微汗至曉身涼而脉已和矣醫曰某平生不曾用仲景方不知其神捷如是予曰仲景之法豈誑後人也哉人自寡學無以發明耳 雲岐子保命集太陽標中風身熱頭痛項強惡

風反下後脉浮而弱自汗而喘肺主於氣上逆而喘因下動胃氣加厚朴屬陽明上氣而逆屬肺加杏仁故宜桂枝加厚朴杏子湯　太陽病禁下下之後身熱惡風脉浮者表未解脉浮而微者陰也法微喘而為傷肺下之傷胃故宜桂枝厚朴杏子湯太陽病外證未解者不可下也下之為逆欲解者宜桂枝湯主之成無已註經曰本發汗而復下之為逆也若先發汗治不為逆太陽病先發汗不解而復下之脉浮者不愈浮為在外而反下之故令不愈今脉浮故知在外當須解外則愈宜桂枝湯主之成無已註經曰柴胡湯證具而以他藥下之柴胡湯仍在者復與柴胡湯此雖已下之不為逆則其顯矣太陽病脉浮緊無汗發熱身疼痛八九日不解表證仍在此當發其汗服藥已微除其人發煩目瞑劇者必衄衄乃解所以然者陽氣重故也麻黃湯主之成無已註脉浮緊無汗發熱身疼痛太陽傷寒也雖至八九日而表証仍在亦當發其汗既服溫暖發散湯藥雖未作大汗亦微除也煩者身熱也邪氣不為汗解鬱而變熱蒸於經絡發於肌表故生熱煩肝受血而能視始者寒氣傷榮寒既變熱則血為熱搏肝氣不治故目瞑也劇者熱甚於經迫血妄行而為衄得衄則熱隨血散而解陽氣重者熱氣重也與麻黃湯以解前太陽傷寒之邪也　龐安時傷寒總病論云脉浮緊無汗服湯未中病其人發煩目瞑極者必衄小衄而脉尚浮者宜麻黃湯衄後脉已微者不可再行也凡脉浮自汗服湯不中病桂枝證尚在必頭痛甚而致衄小衄而脉尚浮者再與桂枝湯衄後脉已微者不可再行也　索矩傷寒新書云衄血後有中大汗而解者甚多　許叔微傷寒九十論失汗衄血證里人秦氏子得傷寒發熱身疼骨節疼痛惡風無汗或者勸其不須服藥待其自安如是半月矣而病不除不得已而召醫一醫至問其日數又不審其脉與外證如何但云已過期矣不可汗不可下也且與調其氣藥與正其氣爾末後召予予診其脉浮濇而緊大此麻黃湯證無可疑者但恐當汗不汗熱化為血則必有衄血之證言未已鼻已衄血余急以麻黃湯與之犀角地黃湯繼之血止而汗解數日愈論曰仲景云凡作湯藥不可避晨夜覺病須臾即宜便治不等早晚則易愈矣或稍遲病即傳變雖欲除治必難為力今之醫者不究根源執以死法必汗之於四日之前下之於四日之下殊不知此大綱也又云病不服藥猶得中醫此為無醫而誤也苟大小便不通必待其自差乎蓋前後不得溲必下部脹悶數日而死矣又況結胷畜血發黃發斑之類未有勿藥而愈者知者知變愚者執迷以取禍也須是隨病淺深在表在

裏或陰或陽早為治療如拯溺然庶易差也素問曰邪風之至疾如風雨故善治者治皮毛其次治肌膚其次治筋脉其次治五藏其次治六府治五藏者半死矣扁鵲望齊侯而走其以此歟　雲岐子保命集太陽標病頭痛惡寒脉浮而緊無汗身疼痛八九日不解者未經發汗微發其汗小除其煩目瞑劇者邪氣循經上攻頭者諸陽之會必作衄也陽氣重故耳宜麻黃湯　太陽標病身熱惡寒脉浮而緊無汗身疼痛表實榮氣不得泄煩躁必衄宜麻黃湯當汗不汗則衄也太陽病脉浮緊發熱身無汗自衄者愈成無已註風寒在經不得汗解鬱而變熱衄則熱隨血散故云自衄者愈二陽併病太陽初得病時發其汗汗先出不徹因轉屬陽明續自微汗出不惡寒若太陽病證不罷者不可下下之為逆如此可小發汗設面色緣緣正赤者陽氣怫鬱在表當解之熏之若發汗不徹不足言陽氣怫鬱不得越當汗不汗其人躁煩不知痛處乍在腹中乍在四肢按之不可得其人短氣但坐以汗出不徹故也更發汗則愈何以知汗出不徹以脉濇故知也成無已註太陽病未解傳併入陽明而太陽證未罷者名曰併病續自微汗出不惡寒者為太陽證罷陽明證具也法當下之若太陽證未罷者為表未解則不可下當小發其汗先解表也陽明之經循面色緣緣正赤者陽氣怫鬱在表也當解之熏之以取其汗若發汗不徹者不足言陽氣怫鬱止是當汗不汗陽氣不得越散邪無從出擁甚於經故躁煩也邪循經行則痛無常處或在腹中或在四肢按之不可得而短氣但責以汗出不徹更發汗則愈內經曰諸過者切之濇者陽氣有餘為身熱無汗是以脉濇知陽氣擁鬱而汗出不徹　龐安時傷寒總病論云二陽併病太陽初得時發其汗汗先出復不徹因轉屬陽明自微汗不惡寒若太陽證不罷不可下下之為逆如此者可小發其汗設面色正赤者陽氣怫鬱在表當解之熏之若汗出不徹當短息不足言陽氣怫鬱不得越當汗出而不汗其人短氣但坐以汗出不徹故也宜麻黃湯更發其汗即愈何以知其汗不徹其脉濇故知也古本字多差誤以從來所見病人證候中符合如此故改正　索矩傷寒新書云併病者一經病未已又一經病是也併病兩經或三經亦合病也　楊仁齋直指方若太陽證尚在桂枝麻黃各半湯若太陽證已退但有陽明者大承氣湯下之　雲岐子保命集太陽經病頭痛項強身熱不罷者不可下是禁也下之為逆醫以小發其汗邪氣不越則面色正赤陽氣怫鬱而不得越也蓋當汗而不汗也故其人躁煩者邪氣不能散也行於經中乍在四肢乍在腹中按之不能得

經一兩次汗解邪氣不除則致病人短氣但坐者虛也故汗出不徹脉浮而濇故知之更發汗則愈脉浮數者法當汗出而愈若下之身重心悸者不可發汗當自汗出乃解所以然者尺中脉微此裏虛須表裏實津液自和便自汗出愈成無已註經曰諸脉浮數當發熱而洒淅惡寒言邪氣在表也是當汗出愈若下之身重心悸者損其津液虛其胃氣若身重心悸而尺脉實者則下後裏虛邪氣乘虛傳裏也今尺脉微身重心悸者知下後裏虛津液不足邪氣不傳裏但在表也然以津液不足則不可發汗須裏氣實津液足便自汗出而愈脉浮緊者法當身疼痛宜以汗解之假令尺中遲者不可發汗何以知之然以榮氣不足血少故也成無已註針經曰奪血者無汗尺脉遲者為榮血不足故不可發汗 龐安時傷寒總病論云陽明病脉遲汗出多微惡寒宜桂枝湯不責榮不足蓋以脉長大而遲也此必軟緊而遲不可汗宜小建中湯又云凡脉緊病必無汗惟濡而緊病必自汗勿誤行桂枝宜建中湯也諸脉動數微弱不可發汗並宜建中湯若煩躁者宜竹葉湯 許叔微普濟本事方昔有鄉人丘生者病傷寒予為診視發熱頭疼煩渴脉雖浮數而無力尺以下遲而弱予曰雖麻黃證而尺遲弱仲景云尺中遲者榮氣不足血氣微少未可發汗予於建中湯加當歸黃耆令飲翌日脉尚爾其家煎迫日夜督發汗藥言幾不遜矣予忍之但只用建中調榮而已至五日尺部方應遂投麻黃湯啜第二服發狂須臾稍定晷睡已中汗矣信知此事是難是難仲景雖云不避晨夜即宜便治醫者亦須顧其表裏虛實待其時日若不循次第暫時得安虧損五藏以促壽限何足貴也南史記范雲初為陳武帝屬官武帝有九錫之命在旦夕矣雲忽感傷寒之疾恐不得預慶事召徐文伯診視以實懇之曰可便得愈乎文伯曰便差甚易只恐二年後不復起耳雲曰朝聞道夕死猶可況二年乎文伯以火燒地布桃葉設席置雲於上頃刻汗解裹以溫粉翌日愈雲甚喜文伯曰不足喜也後二年果卒夫取汗先期尚促壽限況不顧表裏不待時日便欲速効乎每見病家不耐病三四日晝夜促汗醫者隨情順意鮮不敗事故予書此為醫者之戒 潘思敬加減藥證集云假令尺中遲者不可發汗榮氣不足血少故也宜小柴胡湯脉浮者病在表可發汗宜麻黃湯成無已註浮為輕手得之以候皮膚之氣內經曰其在皮者汗而發之脉浮而數者可發汗宜麻黃湯成無已註浮則傷衛數則傷榮榮衛受邪為病在表故當汗散 王叔和脉經云太陽病脉浮而緊者可發其汗屬桂枝湯證病常自汗出者此為榮氣和榮氣

和者外不諧以衛氣不共榮氣和諧故爾以榮行脉中衛行脉外復發其汗榮衛和則愈宜桂枝湯成無已註風則傷衛寒則傷榮衛受風邪而榮不病者為榮氣和也衛既客邪則不能與榮氣和諧亦不能衛護皮膝是以常自汗出與桂枝湯解散風邪調和榮衛則愈　雲岐子保命集太陽中風脉浮而緩今反浮而濇者因小發汗脉濇而緊者身必疼痛當太發汗如尺中弱者不可發汗尺者陰也弱者陰虛也陰主血虛則尺虛不能作汗故知禁也病常自汗出榮氣和也不解者衛氣不與榮氣和也脉若榮衛之中榮衛和則脉平榮衛不和則脉病當和榮衛使脉得平宜桂枝湯病人藏無他病時發熱自汗出而不愈者此衛氣不和也先其時發汗則愈宜桂枝湯主之成無已注藏無他病裏和也衛氣不和表病也外臺云裏和表病汗之則愈所謂先其時者先其發熱汗出之時發汗則愈　雲岐子保命集太陽病身熱惡寒惡風脉浮而弱自汗出而不止榮衛不和也宜桂枝湯傷寒脉浮緊不發汗因致衄者麻黃湯主之成無已註傷寒脉浮緊邪在表也當與麻黃湯發汗若不發汗則邪無從出擁甚於經迫血妄行因致衄也傷寒不大便六七日頭痛有熱者與承氣湯其小便清者知不在裏仍在表也當須發汗若頭痛者必衄宜桂枝湯成無已註不大便六七日頭痛有熱者故宜當下若小便清者知裏無熱則不可下經曰小便數者大便必鞕不更衣十日無所苦也況此不大便六七日小便清者不可責邪在裏是仍在表也與桂枝湯以解外若頭疼不已為表不罷鬱甚於經迫血妄行止為衄也　雲岐子保命集太陽病脉浮而弱身熱小便清知不在裏太陽本不病邪在標宜桂枝湯　太陽病若頭痛者必衄乃邪無從出也宜桂枝湯傷寒發汗解半日許復煩脉浮數者可更發汗宜桂枝湯主之成無已註煩者熱也發汗身涼為已解至半日許身復熱脉浮數者邪不盡也可更發汗與桂枝湯凡病若發汗若吐若下若亡津液陰陽自和者必自愈成無已註重亡津液則不能作汗必待陰陽自和乃自愈矣大下之後復發汗小便不利者亡津液故也勿治之得小便利必自愈成無已註因亡津液而小便不利者不可以藥利之俟津液足小便利必自愈也下之後復發汗必振寒脉微細所以然者以內外俱虛故也成無已註發汗則表虛而亡陽下之則裏虛而亡血振寒者陽氣微也脉微細者陰血弱也下之後復發汗晝日煩躁不得眠夜而安靜不嘔不渴無表證脉沉微身無大熱者乾薑附子湯主之成無已註下之虛其裏汗之虛其表既下又汗則表裏俱虛陽至於晝陽欲復虛不勝邪

正邪交爭故晝日煩躁不得眠夜陰生陽虛不能與之爭是夜則安靜不嘔不渴者裏無熱也身無大熱者表無熱也又無表證而脉沉微知陽氣大虛陰寒氣勝與乾薑附子湯退陰復陽　施虛續易簡方論薑附湯今亦顯載於局方附子皆云生用斷斷不易凡世之倚傍聖教膚淺稱醫者視為日用常行何碩與志寧亦各不曾過目一誤一縱悉云熟用然生之與熟大相遠絶利害所關是不學之誤一也其方仲景二出用乾薑一兩附子一枚生去皮臍然附子縱重一兩去皮臍已不等分況有不重一兩者乎無其方載乾薑既為主治之君在附子之上已知其不責附子之等分也碩不獨不載生用却載二味各一兩是不學之誤二也本方只主治傷寒經汗下已之後晝日煩躁不得眠碩落不得眠三字志寧不與增添夜而安靜不嘔不渴無表證身無大熱脉候沉微仲景見其晝雖煩躁夜已安靜不嘔不渴表證已無脉候沉微慮變為陰極之證故處乾薑引其陽行其脉生附逐其元傷之寒邪碩指炮熟為用邪可去乎是不學之誤三也碩至於本方服餌法後引仲景分脉為證復反不遵仲景本法云脉候沉微却云六脉沉伏脉按之微骨不足舉之無有微脉極細而軟手下若有若無王叔和分別二脉者正以各有主病今指微為伏是不學之誤四也又云易熟附為生名白通湯治傷寒下利是不學之大誤五也竊詳傷寒下利仲景立二十四法朱肱分為二十五條各隨其兼見之證各著其對病之方有與猪苓湯者有與生薑瀉心湯者有與猪膚湯者有與甘草瀉心湯者有與大柴胡湯者有與四逆湯者有與當歸四逆湯者有與通脉四逆湯桃花湯眞武湯白頭翁湯梔子豉湯小青龍加荛花湯五苓散桂枝人參湯十棗湯葛根黄芩湯赤石脂禹餘糧湯大承氣等湯之不一惟有少陰病下利脉微一證始屬白通湯耳碩但欲合易簡之名不分脉證只以傷寒下利四字總包之白通湯一藥總治之只此誤自有一十九證非獨五也不知自慶元丙辰至淳祐辛丑凡有易簡摸其病套其方投其藥變壞睛殺幾人志寧不與增修復從其誤使人重信則必自淳祐辛丑傳十信五寖寖不已又復殺人無已時矣痛哉痛哉更詳陳之啓發其昧仲景一百一十三方用附子者二十一熟用者十有三必佐麻黄桂枝大黄黄連黄芩細辛輩生用者八薑附湯四逆湯白通湯白通加猪膽汁湯通脉四逆湯四逆加猪膽汁湯四逆人參湯茯苓四逆湯是也必方方皆用乾薑為主未聞用熟附佐乾薑也學不造此則將何以語湯劑瘳民瘼耶　雲岐子保命集少陰本病論少陰脉尺寸俱沉標本俱陰其經

始於足心。循腹上行。繫舌本。貫腎絡肺。故口燥舌乾而渴。為經病也。身寒自汗。四肢攣。小便清。腹滿惡寒。脉沉而微。此少陰本病也。當溫之。宜附子葶。治少陰。乃以熱治寒。皆少陰本藥也。王好古陰證畧例云。若自汗者。朮附湯。若無汗者。薑附湯。李仲南永類鈐方。薑附湯治傷寒自利。六脉沉伏。手足厥冷。

乾薑附子湯

乾薑一兩。味辛熱　附子一枚生用。去皮破八片。味辛熱

內經曰。寒淫所勝。平以辛熱。虛寒太甚。是以辛熱劑勝之也。

右二味以水三升。煑取一升。去滓。頓服。

龐安時傷寒總病論云不可作煑散。

發汗後身疼痛。脉沉遲者。桂枝加芍藥生薑各一兩。人參三兩。新加湯主之。成無已註。汗後身疼痛。邪氣未盡也。脉沉遲。榮血不足也。經曰。其脉沉者。榮氣微也。又曰。遲者榮氣不足。血少故也。與桂枝湯以解未盡之邪。加芍藥。生薑。人參。以益不足之血。朱肱傷寒活人書。又問發汗後身疼痛。脉沉而遲。當用何藥。答曰。仲景有桂枝加芍藥生薑人參新加湯。蓋為此證也。小建中湯無治汗後身痛。脉沉而遲者。若霍亂吐瀉止而身疼痛不休者。少與桂枝湯即愈。發汗後不可更行桂枝湯。汗出而喘。無大熱者。可與麻黃杏仁甘草石膏湯主之。成無已註。發汗後喘。當作桂枝加厚朴杏仁湯。汗出則喘愈。今汗出而喘。為邪氣擁甚。桂枝湯不能發散。故不可更行桂枝湯。汗出而喘。有大熱者。內熱氣甚也。無大熱者。表邪必甚也。與麻黃杏仁甘草石膏湯。以散其邪。雲岐子保命集。太陽標病。脉浮緊而頭痛已發。其汗雖漏不止。不可行桂枝。自汗而喘。邪在上焦而無大熱者。未傳入裏也。宜麻黃杏子甘草石膏湯。石膏之氣清。治太陽頭痛。甘緩其中。杏仁治上焦之喘。非麻黃發汗之治也。

麻黃杏仁甘草石膏湯方

麻黃四兩。去節。味甘溫　杏仁五十箇。去皮尖。味甘溫

甘草二兩。炙。味甘平　石膏半斤。碎。綿裹。味甘寒

內經曰。肝苦急。急食甘以緩之。風氣通於肝。風邪外甚。故以純甘之劑發之。

右四味以水七升。先煑麻黃減二升。去上沫。內諸藥。煑取二升。去滓。溫服一升。

發汗過多。其人叉手自冒心。心下悸。欲得按者。桂枝甘草湯主之。成無已

註。發汗過多。亡陽也。陽受氣於胷中。胷中陽氣不足。故病又手自胃心心下悸欲得按者。與桂枝甘草湯。以調不足之氣。　許叔微傷寒九十論。又手胃心證。乙巳六月。吉水一商譚姓。寓城南。得傷寒八九日。心下惕惕然以兩手捫心。身體振振動搖。醫者以為心下痛。治之不效。予曰。此汗過多之所致也。仲景云。未持脉時。病人叉手自冒心。心下悸。所以然者。以裏發汗虛故如此。又云。發汗過多。其人叉手自冒心。心下悸欲得按者。桂枝甘草湯證。予授以黃耆建中。眞武。及甘草桂枝。漸得平復。　雲岐子保命集。太陽病身熱頭痛。脉浮而緊。無汗。醫發汗過多。其人叉手自冒心。心悸欲得按者。因發汗多虛故也。宜桂枝加甘草湯。甘以緩之也。

桂枝甘草湯方

桂枝四兩去皮。味辛熱　甘草二兩炙。味甘平

桂枝之辛。走肺而益氣。甘草之甘。入脾而緩中。

右二味以水三升。煑取一升。去滓分服。

發汗後其人臍下悸者。欲作奔豚。茯苓桂枝甘草大棗湯主之。成無已註。汗者心之液。發汗後臍下悸者。心氣虛而腎氣發動也。腎之積名曰奔豚。發則從少腹上至心下。為腎氣逆欲上凌心。今臍下悸。為腎氣發動。故云作奔豚。與茯苓桂枝甘草大棗湯。以降腎氣。　雲岐子保命集。太陽病發汗後表解。其人臍下悸者。邪氣內結。欲作奔豚。當散之。宜茯苓桂枝甘草大棗湯。

茯苓桂枝甘草大棗湯方

茯苓半斤。味甘平　甘草二兩炙。味甘平

大棗十五枚擘。味甘平　桂枝四兩去皮

茯苓以伐腎邪。桂枝能泄奔豚。甘草大棗之甘。滋助脾土。以平腎氣。

煎用甘爛水者。揚之無力。取不助腎氣也。

右四味以甘爛水一斗。先煑茯苓減二升。內諸藥煑取三升。去滓溫服一升。日三服。作甘爛水法。取水二斗。置大盆內。以杓揚之。水上有珠子五六千顆相逐。取用之。李知先傷寒活人書括云一名勞水。蓋水性本鹹。勞之則甘也。李仲南永類鈐方云七味蔥白湯用勞水者。同此義也。

發汗後腹脹滿者。厚朴生薑甘草半夏人參湯主之。成無已註。吐後腹脹與下後腹滿皆為實。言邪氣乘虛入裏為實。發汗後外已解也。腹脹滿。知非裏實。由脾胃津液不足。氣滯不通。壅而為滿。與此湯和脾胃而降氣。

厚朴生薑甘草半夏人參湯方

厚朴半觔去皮炙味苦溫　生薑半觔切味辛溫

半夏半升洗味辛平　人參一兩味溫

甘草二兩炙味甘平

內經曰脾欲緩急食甘以緩之用苦泄之厚朴之苦以泄腹滿人參甘草之甘以益脾胃半夏生薑之辛以散滯氣

右五味以水一斗煑取三升去滓溫服一升日三服太平聖惠方云厚朴用生薑汁炙令香熟

傷寒若吐若下後心下逆滿氣上衝胷起則頭眩脉沉緊發汗則動經身爲振振搖者茯苓桂枝白术甘草湯主之成無已註吐下後裏虛氣上逆者心下逆滿氣上衝胷表虛陽不足起則頭眩脉浮緊爲邪在表當發汗脉沉緊爲邪在裏則不可發汗發汗則外動經絡損傷陽氣陽氣外虛則不能主持諸脉身爲振振搖也與此湯以和經益陽　雲岐子保命集太陽經傷寒若吐邪在上焦若下邪在裏也吐下後不愈非其治也心下逆滿者下之過也氣上衝胷起則頭眩者吐之過也脉沉緊者發汗動經浮緊當汗沉緊不當汗故汗則動經身爲振搖宜茯苓桂枝白术甘草湯　王好古醫壘元戎云心下痰飲胷膈支滿目眩當以桂枝茯苓甘草白术湯主之小便則利氣短有微飲當從小便去也亦以上藥主之腎氣丸亦主之

茯苓桂枝白术甘草湯方

茯苓四兩味甘平　桂枝三兩去皮味辛熱

白术二兩味苦甘溫　甘草二兩炙味甘平

陽不足者補之以甘茯苓白术生津液而益陽也裏氣逆者散之以辛桂枝甘草行陽散氣

右四味以水六升煑取三升去滓分溫三服

發汗病不解反惡寒者虛故也芍藥甘草附子湯主之成無已註發汗病解則不惡寒發汗病不解表實者亦不惡寒今發汗病且不解又反惡寒者榮衛俱虛也汗出則榮虛惡寒則衛虛與芍藥甘草附子湯以補榮衛雲岐子保命集發汗病不解反惡寒者虛故也小便清大便依度腹痛者皆宜芍藥甘草附子湯

芍藥甘草附子湯方

芍藥三兩味酸微寒　甘草三兩炙味甘平

附子一枚炮去皮破八片味辛熱

芍藥之酸收斂津液而益榮附子之辛溫固陽氣而補胃甘草之甘調和辛酸而安正氣

右三味以水五升煑取一升五合去滓分溫服疑非仲景意

發汗若下之病仍不解煩躁者茯苓四逆湯主之成無已註汗發若下病宜解也若病仍不解則發汗外虛陽氣下之內虛陰氣陰陽俱虛邪獨不解故生煩躁與茯苓四逆湯以復陰陽之氣 索矩傷寒新書云病經汗下有虛有實 尚從善傷寒紀玄妙用集云四逆湯以補陽加茯苓人參以益陰陰陽之氣既復而煩之證解矣

茯苓四逆湯方

茯苓六兩味甘平 人參一兩味甘溫

附子一枚生用去皮破八片味辛熱 甘草二兩炙味甘平

乾薑一兩半味辛熱

四逆湯以補陽加茯苓人參以益陽

右五味以水五升煑取三升去滓溫服七合日三服

發汗後惡寒者虛故也不惡寒但熱者實也當和胃氣與調胃承氣湯成無已註汗出而惡寒者表虛也汗出而不惡寒但熱者裏實也經曰汗出不惡寒者此表解裏未和與調胃承氣湯和胃氣 孫思邈千金翼方云不惡寒但熱者實也當和其胃氣宜小承氣湯一云調胃承氣湯 索矩傷寒新書云發汗後惡寒者虛也不惡寒但熱者實也此各一端耳蓋發汗後惡寒有實但熱有虛如此則亦悟百病皆有虛實也若泥汗後惡寒止為虛但熱止為實殆如按圖索駿耳是止知其一莫知其他也餘證倣此

太陽病發汗後大汗出胃中乾煩躁不得眠欲得飲水者少少與飲之令胃氣和則愈若脉浮小便不利微熱消渴者與五苓散主之成無已註發汗已解胃中乾煩躁不得眠欲飲水者少少與之胃氣得潤則愈若脉浮者表未解也飲水多而小便少者謂之消渴裏熱甚實也微熱消渴者熱未成實上焦燥也與五苓散生津液和表裏 方侯述中濟急經驗單方惠傷寒人若發熱欲飲水者即須便與水喫如是飲水過多結伏胷膈當服五苓散或陷胷丸 成無已傷寒明理論五苓散方苓令也號令之令矣通行津液剋伐腎邪專為號令者苓之功也五苓之中茯苓為主故曰五苓散茯苓味甘平猪苓味甘平甘雖甘也終歸甘淡內經曰味淡滲泄為陽利大便曰攻下利小便曰滲泄水飲內畜當須滲泄之必以甘淡為主是以茯苓為君猪苓為臣白术味甘溫脾惡濕水飲內畜則脾氣不

治。益脾勝濕。必以甘為助。故以白术為佐。澤瀉味鹹寒。內經曰。鹹味下泄為陰。泄飲導溺。必以鹹為助。故以澤瀉為使。桂味辛熱。腎惡燥。水畜不行則腎氣燥。內經曰。腎惡燥。急食辛以潤之。散濕潤燥。可以桂枝為使。多飲煖水。令汗出愈者。以辛散水氣外泄。是以汗潤而解也。　施盧續易簡方論五苓散。孫舉主治陽明經傷寒發熱。渴欲飲水。小便不利。及主治少陰病下利六七日。欬而嘔渴。心煩不得眠。皆以猪苓湯。妄云即五苓散去桂加滑石。仲景即無陽明經傷寒發熱渴欲飲水之證。只有脉浮發熱。渴欲飲水。小便不利者。猪苓湯。其脉浮者。乃太陽經傷寒。即非屬陽明經脉。此出證誤。孫云猪苓湯。即五苓散去桂加滑石。合去桂并去白术。不云去术。只云去桂合加滑石。阿膠。只加滑石。不加阿膠。誤皆此甚。傷暑中暑伏暑。衛生家寶五苓散治傷寒汗後發渴。小便不利。若陽明汗多而渴者。不可用。宜竹葉湯。　劉守真傷寒直格。五苓散治中暑并傷寒。大發汗後胃中乾煩躁不得眠。脉浮小便不利。微熱煩渴。及表裏俱熱。飲水反吐。名曰水逆。或攻痞不解。或口乾煩渴。小便不利。或痞尚在。而利不止者。或當汗而反下之。利遂不止。脉浮表不解。自利。或小便不利者。危用五苓散證。無問脉之沉浮。或一切留飲不散。以此散水止渴。并解兩感太陽少陽俱病。經言六經病證者是也。或一切吐瀉霍亂。無問寒熱及小兒瀉。驚風無問急慢。皆宜服之。　雲岐子保命集。太陽經病發汗後大汗出。表解也。津液內少。胃中乾燥而不得眠。故欲飲水。小便不通。水無所歸也。宜五苓散。　太陽證發於標者。汗而解之。發於裏者。攻而利之。病在太陽。渴而飲水者。熱結膀胱也。膀胱者。傳導津液之府。故有熱則多渴而煩。小便不利。宜五苓散。是太陽入本藥也。五苓散太陽經藥。白虎湯陽明經藥。猪苓湯少陰經藥。　王好古此事難知。論五苓為下劑。五苓散太陽裏之下藥也。太陽高則汗而發之。下則引而竭之。渴者入太陽本也。當下之。使自膀胱中出也。火濕相合。腎燥膀胱熱。小便不利。此藥主之。小便利不宜用。然太陽病熱而渴。小便雖利。亦宜五苓散下之。當服不服。則生何證。答曰。當服而不服。穀消水去。必就陽明燥火戊胃發黃。故有調胃承氣湯證。此太陽入本失下也。不當服服之。則生何證。答曰。不當服服之。是為犯本。小便強利。津液重亡。侵陽之極。則侵陰。而成血證也。輕則桃仁承氣。重則抵當。故五苓散調和陰陽者。乃太陽陽明之間。故為調和之劑。酒毒小便亦澀。宜五苓散。若熱在中焦。未入太陽之本。小便自利而清。是津液已行。若與五苓利之。是重涸腎水也。不惟重涸腎水。酒毒之熱亦不能去。故上下通澀而發黃

也。若入血室。則畜血也。五苓散以瀉濕熱。假令太陽證傷寒自外入。標本有二說。以主言之。膀胱為本。經絡為標。以邪言之。先得者為本。後得者為標。此標先受之。即是本也。後入于膀胱。本却為標也。此乃客邪之標本也。治當從客之標本。若小腸火為本。若膀胱水為本。寒毒之氣。從標入本。邪與手經相合。而下至膀胱。五苓主之。桂枝陽中之陽。茯苓陽中之陰。相引而下入于本。導出邪氣。丙火手經小腸。自上之下。足經膀胱。自下之上。火邪之氣。從下之上。以內為本。水中有火。火為客氣。當再責其本。兩腎相通又在下部。責在下焦。如漬。相火明矣。生地黃。黃檗。邪從本受。下焦火邪遺於小腸。是熱在下焦。填塞不便。自內之外也。表之裏藥。桂枝。澤瀉。猪苓。茯苓。為陽中之陰。裏之表藥。生地黃。黃連。黃檗。為陰中之陽。治酒病宜發汗。若利小便。炎焰不肯下行。故曰火鬱則發之。辛溫散之。是從其火體也。是知利小便。則濕去熱不去。動大便。尤為疎慢。大便者。有形質之物。酒者無形之水。從汗而發之。最為之近。是濕熱俱去。以辛溫發其火也。佐以苦寒除其濕也。 王好古醫壘元戎論五苓散。若胃弱小便少。亦宜少減二苓。澤瀉。加白术桂。佐以生薑之類。 若水停心下。煎生薑三錢。或半兩。味濃調服五苓散秤三錢。或半兩亦可。 太陽標病傳入標之本。發渴。溺不利。以此散導之。邪自膀胱而出也。若未渴妄用五苓散。反引邪氣入裏。而不能解也。故易老云。五苓散即太陽經之下藥也。若傷寒太陽脉緊而渴者。不宜用此。 陽明證後有仲景五苓散一條。甘露飲枳术湯。梅師方一以其消痞去水。故入陽明例。 飲酒而泄瀉者。脾胃受濕也。何以知之。仲景厥而心下悸者。宜先治水。當服茯苓甘草湯。却治其厥。不爾。水漬入胃。必作利也。故飲而瀉者。五苓散。甘露飲。神効。飲酒若過度。必作利者。裏急後重者。濕熱之毒。浸漬腸胃也。當作別治。 甘露飲。即五苓散去猪苓加石膏。寒水石。滑石。甘草。是也。 並用濃生薑湯調服。食前。其所加三石。臨時視病寒熱輕重多少。隨宜用之。假令病人臍下有悸者。吐涎沫而顛眩水也。五苓散主之。 李仲南永類鈐方云。五苓散。吹咀清入脾。末子濁入胃。中暑心神恍惚。加辰砂。隔年者不可用。 危亦林得効方云。五苓散治秋合涼。反淫雨。冬發濕疫。 李憲德生堂經驗方。五苓散夏月加柴胡。麥門冬。云此藥汗之輕者。 潘思敬加減藥證集。五苓散。逐證加減。陽明證去桂。發斑加朱砂末。中酒加乾葛。頭腦痛加川芎。咳嗽加五味子。心氣不足加麥門冬。胃中嘔吐加人參。去濕加蒼术。定喘加馬兜鈴。痰多加半夏。小便閉澀加瞿麥。大小便不通加黃連。腹中痛加三稜。退熱加青皮。盜汗

加麻黃根。衄血加烏藥。勞復加桔梗。目赤加芍藥。退腫加茵蔯。眼白肉赤加石膏。止瀉加陳皮。水腫加葶藶。伏暑加燈心。下部赤腫加椒紅。眼黃加前胡。又云。水無所歸。宜五苓散。水結心下亦同。汪疇傷寒發明書云。手太陽小腸經。與手少陰心經為表裏。以應主氣言。則君火司令。天之熱也。經曰。水流下而就濕。火炎上而就燥。故暑熱中人。則火之藏腑先受之者。病在手太陽少陰也。凡傷寒汗出不解。脉浮發熱煩渴。小便不利者。手太陽經受病也。小腸者。受盛之腑。其經受病。宜疏利水道以滲之。五苓散猪苓湯證是也。

五苓散方

猪苓 十八銖。味甘平去皮　澤瀉 一兩六銖半。味酸鹹

茯苓 十八銖。味甘平　桂 半兩。去皮。味辛熱

白术 十八銖。味甘平

淡者一也。口入一而為甘。甘甚而反淡。甘緩而淡滲。猪苓白术茯苓三味之甘。潤虛燥而利津液。鹹味下泄為陰。澤瀉之鹹。以泄伏水。辛甘發散為陽。桂枝之辛甘。以和肌表

右五味為末。以白飲和服方寸匕。日三服。多飲煖水。汗出愈。

發汗已。脉浮數。煩渴者。五苓散主之。成無已註。發汗已浮數者。表邪未盡也。煩渴。亡津液胃燥也。與五苓散和表潤燥。傷寒汗出而渴者。五苓散主之。成無已註。傷寒汗出而渴者。亡津液胃燥。邪氣漸傳裏也。五苓散以和表裏。若汗出不渴者。邪氣不傳裏。但在表而表虛也。與茯苓甘草湯和表合衛。

茯苓甘草湯方

茯苓 二兩。味甘平　桂枝 二兩。去皮。味辛熱

生薑 三兩切。味辛溫　甘草 一兩。炙。味甘平

茯苓甘草之甘。益津而和衛。桂枝生薑之辛。助陽氣而解表。

右四味以水四升。煑取二升。去滓。分溫三服。

中風發熱六七日不解而煩。有表裏證。渴欲飲水。水入則吐者。名曰水逆。五苓散主之。成無已註。中風發熱。至六七日則當解。若不解煩者。邪在表也。渴欲飲水。邪傳裏也。裏熱甚則能消水。水入則不吐。裏熱少則不能消水。停積不散。飲而吐水也。以其因水而吐。故名水逆。與五苓散和表裏。散停飲。未持脉時。病人手叉自冒心。師因教試令欬而不欬者。此必兩耳聾無聞也。所以然者。以重發汗虛故如此。成無已註。發汗多亡陽。胷中陽氣

不足者。病人手又自冒心。師見外證。知陽氣不足也。又試令欬而不即欬者耳聾也。知陽氣虛明矣。耳聾者。陽氣虛。精氣不得上通於耳故也。許叔微傷寒九十論傷寒耳聾證。戊申年類試山陽。一時官病傷寒八九日耳聾而無聞。有醫者作少陽治。意謂仲景稱少陽受病。則胷脇痛而耳聾也。予診其脉見兩手弱而無力。予曰。此非少陽。若以少陽則渴飲心煩。但寐咽痛。今俱無此證。但多汗驚悸。必汗過多之所致也。仲景云。未持脉時令病人欬而不欬者。兩耳聾無所聞也。所以然者。以重發汗虛故如此。病家曰。醫者嘗多發汗矣。予授以眞武白术附子湯輩。數日耳聾調治得愈。

發汗後飲水多必喘。以水灌之亦喘。成無已註。喘。肺疾。飲水多喘者。飲冷傷肺也。以冷水灌洗而喘者。形寒傷肺也。發汗後水藥不得入口爲逆。若更發汗。必吐下不止。成無已註。發汗後水藥不得入口。爲之吐逆。發汗亡陽。胃中虛冷也。若更發汗。則愈損陽氣。胃氣大虛。故吐下不止。發汗吐下後虛煩不得眠。若劇者必反覆顛倒。心中懊憹。梔子豉湯主之。成無已註。發汗吐下後。邪熱乘虛客於胷中。謂之虛煩者熱也。胷中煩熱。鬱悶而不得發散者是也。熱氣伏於裏者。則喜睡。今熱氣浮於上。煩擾陽氣。故不得眠。心惡熱。熱甚則必神昏。是以劇者。反覆顛倒而不安。心中懊憹而憤悶懊憹者。俗謂鬱突是也。內經曰。其高者因而越之。與梔子豉湯。以吐胷中之邪。成無已傷寒明理論梔子豉湯方。內經曰。其高者因而越之。其下者引而竭之。中滿者瀉之於內。其有邪者漬形以爲汗。其在皮者汗而發之。治傷寒之妙。雖有變通。終不越此數法也。傷寒邪氣自表而傳裏。留於胷中爲邪在高分。則可吐之。是越之之法也。所吐之證。亦自不同。如不經汗下。邪氣蘊鬱於膈。則謂之膈實。應以瓜蔕散吐之。瓜蔕散吐胷中實邪者也。若發汗吐下後。邪氣乘虛留於胷中。則謂之虛煩。應以梔子豉湯吐之。梔子豉湯吐胷中虛煩者也。梔子味苦寒。內經曰。酸苦湧泄爲陰。湧者吐之也。湧吐虛煩。必以苦爲主。是以梔子爲君。煩爲熱勝也。湧熱者必以苦勝熱者必以寒。香豉味苦寒。助梔子以吐虛煩。是以香豉爲臣。內經曰。氣有高下。病有遠近。證有中外。治有輕重。適其所以爲治。依而行之。所謂良矣。劉守眞傷寒直格云。凡諸梔子湯。皆非吐人之藥。以其燥熱結之甚。而藥頗攻之。不能開通。則鬱發而吐。因其嘔吐。發開鬱結。則氣通津液宣行而已。故不須再服也。王好古醫壘元戎云。若少氣者加甘草以邪在上焦而不受藥。故吐之。雲岐子保命集。汗下後心中懊憹。頭汗出。煩而不得眠。心中微結而痛者。梔子豉湯主之。傷寒醫以丸藥下之。身熱不

去裏不結微煩而不得眠者梔子乾薑湯主之傷寒汗下後喘而不得眠者梔子豉加杏仁二十枚主之傷寒汗下後咳嗽而煩不得眠者梔子豉加人參芍藥各五錢主之傷寒發表攻裏之後傳變不同下之早而有結胸痞氣結胸者邪氣結而實痞氣者邪氣痞而虛虛實之間邪在心中與正氣相搏懊憹而煩不得眠者宜梔豉湯大抵不得眠者從陽明所得太陽中所有梔豉湯者自太陽而傳陽明也謂之曰太陽梔豉湯陽明有梔豉湯者本經自傳而得之者也 李憲德生堂經驗方梔子豆豉湯治傷寒六七日後脇腹疼大便結始因酒食所傷發熱發渴者枳實一錢厚朴二錢山梔子一錢大黃三錢另研豆豉三錢右㕮咀如法修製分作二服每服水一盞半生薑三片煎一大盞却下大黃再煎去滓溫服此下藥之輕者

梔子豉湯方

梔子十四枚擘味苦寒 香豉四合綿裹味苦寒

酸苦湯泄為陰苦以湯吐寒以勝熱梔子豉湯相合吐劑宜矣

右二味以水四升先煮梔子得二升半內豉煮取一升半去滓分為二服溫進一服得吐者止後服

若少氣者梔子甘草豉湯主之若嘔者梔子生薑豉湯主之成無已註少氣者熱傷氣也加甘草以益氣嘔者熱煩而氣逆也加生薑以散氣少氣則氣為熱搏散而不收者甘以補之可也嘔則氣為熱搏逆而不散者辛以散之可也發汗若下之而煩熱胸中窒者梔子豉湯主之成無已註陽受氣於胸中發汗若下使陽氣不足邪熱客於胸中結而不散煩熱而胸中窒塞與梔子豉湯以吐胸中之邪傷寒五六日大下之後身熱不去心中結痛者未欲解也梔子豉湯主之成無已註傷寒五六日邪氣在裏之時若大下後身熱去心胸空者為欲解若大下後身熱去而心結痛者結胸也身熱不去心中結痛者虛煩也結胸為熱結胸中為實是熱氣已收斂於內則外身熱去虛煩為熱客胸中未結為實散漫為煩是以身熱不去六七日為欲解之時以熱為虛煩故云未欲解也與梔子豉湯以吐除之傷寒下後心煩腹滿臥起不安者梔子厚朴湯主之成無已註下後但腹滿而不心煩即邪氣入裏為裏實但心煩而不腹滿即邪氣在胸中為虛煩既煩且滿則邪氣壅於胸腹間也滿則不能坐煩則不能臥故臥起不安與梔子厚朴湯吐煩泄滿 王好古醫壘元戎云梔子湯五法皆汗下吐後用之以邪氣陷於胸中居最高之分故隨證加減用之經曰其高

者因而越之。

梔子厚朴湯方

梔子十四枚擘。味苦寒　厚朴四兩薑炙。味苦溫

枳實四枚。水浸去瓤炒。味苦寒

酸苦湧泄。梔子之苦以湧虛煩。厚朴枳實之苦以泄腹滿。

已上三味以水三升半。煑取一升半。去滓分二服。溫進一服得吐者止後服。李憲德生堂經驗方云此藥吐之輕者。

傷寒醫以丸藥大下之。身熱不去。微煩者。梔子乾薑湯主之。成無已註。丸藥不能除熱。但損正氣。邪氣乘虛留於胷中。而未入深者。則身熱不去。而微煩。與梔子乾薑湯吐煩正氣。

梔子乾薑湯方

梔子十四枚擘。味苦寒　乾薑二兩味辛熱

苦以湧之。梔子之苦以吐煩。辛以潤之。乾薑之辛以益氣。

右二味以水三升半。煑取一升半。去滓分二服。溫進一服得吐者止後服。

凡用梔子湯病人舊微溏者。不可與服之。成無已註。病人舊微溏者。裏虛而寒在下也。雖煩則非蘊熱。故不可與梔子湯。內經曰。先泄而後生他病者。治其本。必且調之。後乃治其他病。太陽病發汗。汗出不解。其人仍發熱心下悸。頭眩身瞤動。振振欲擗地者。眞武湯主之。成無已註。發汗不解。仍發熱。邪氣未解也。心下悸。頭眩身瞤動。振振欲擗地者。汗出亡陽也。裏虛為悸。上虛為眩。經虛為身瞤。振振搖。與眞武湯主之。溫經復陽。　許叔微晉濟本事方云。鄉里有姓京者。以鬻繩為業。子年三十。初得病身微汗。脉弱。惡風。醫以麻黃藥與之。汗遂不止。發熱心多驚悸。夜不得眠。譫語不識人。筋惕肉瞤。振振動搖。醫者又進驚風藥。予曰。強汗之過也。仲景云。脉微弱。汗出惡風。不可服青龍湯。服之則筋惕肉瞤。此為逆也。惟眞武湯可救。進此三服。佐以清心丸。竹葉湯。數日遂愈。　施盧續易簡方論眞武湯。如發熱而泄瀉者。服此藥。或未止。宜投四逆湯。兼下震靈丹。當應手而愈。此藥不惟陰證傷寒可服。若虛勞之人。憎寒壯熱。咳嗽下利。皆宜服之。因易名固陽湯。增損一如前法。今人每見寒熱證。便作虛勞治之。及病後未復常者。多用地黃。當歸。鹿茸。輩補益精血。殊不知此等藥味。多欲戀膈。若脾胃大段充實。服之却能滋養。然猶恐因時致傷胃氣。胃為倉廩之官。受納水穀之處。五臟皆取氣於胃。所謂精氣血氣。皆由穀氣而生。若用地黃等

藥未見其為生血而穀氣已先有所損矣此孫兆謂補腎不如補脾正謂是也故莫若以固陽湯調其寒熱不致傷脾飲食不減則血氣自生若勞瘵之疾已成無藥能療惟膏肓灸法最為效驗然傷晚亦恐不及其他證狀胃風湯逍遙飲方中具言之又按活人書云太陽病發汗汗出不解其人仍發熱心下悸頭眩身瞤動振振欲擗地者眞武湯主之少陰病二三日不已至四五日腹痛小便不利四肢沈重疼痛自下利此為水氣其人或利或小便利或不利或嘔者眞武湯主之由是而觀則知此藥不獨能治太陽病而少陰病亦治之也王氏因其水氣之說乃云此由渴後飲水停留中脘所致即此以明心悸頭暈身熱瞤動等證意以為皆少陰病而不知此證乃太陽傷風合行桂枝誤作傷寒醫治用麻黃以發汗汗出過多亡陽發熱而致此不應泛引痰飲之證為傷寒之證謬矣然其加減雖本於活人書而附子一節較之孫氏祕寶則互相矛盾使後學無所適從活人書云嘔者去附子加生薑三片夫生薑嘔家聖藥治嘔用此固宜如寒嘔則附子不當去祕寶云不下利去附子加生薑合前作半觔使果不下利附子去亦無害既不言治嘔則增生薑何義王氏於此獨加生薑而不去附子生薑固治嘔矣而附子尚存以之治寒嘔則可若熱而嘔者豈不敗廻事哉三家皆說未盡當作不下利而嘔者去附子加生薑如此方可以貫三家之說也　又按仲景云主治有二一以治太陽病發汗汗出不解其人心下悸頭眩身瞤動振振欲擗地者仲景謂汗多亡陽而然碩叙證反云此由渴後飲水停留中脘所致兼上項證只是經汗不解碩自添一下字作經汗下不解一誤仲景一云治傷寒二三日不已至四五日腹痛小便不利四肢沉重疼痛自下利者仲景謂此證有水氣而然碩反不云因有水氣二誤又落却小便不利四字三誤仲景審證知四肢沈重疼痛乃水性沈重故痛亦沈重碩落却沈重緊要兩字四誤仲景云自下利碩反作大便自利則是大便如常流利未為清切自下利即是小便不利因為自下利此正如不因醫家藥發其汗而自有汗類也五誤及其述仲景加減法小便已利者去茯苓見得元有小便不利一證下利者去芍藥加乾薑見得係是自下利不是大便如常自利嘔者去附子加乾薑碩不云去附子只云每服加生薑五片只加減中又成此誤志寧懵然莫曉增不增修不修蕎地於是方後捨去論傷寒證治自入野說以表有學濫云今人每見寒熱多用地黃當歸麻茸輩補益精血殊不知藥味多甘却成戀膈詳前三品誠未為甘若製為丸又何戀膈況夫物性有盡制而用

之將使無盡物用有窮變而通之將使無窮志寧何爾執一而廢百也既又呆曰若脾大既充實方能滋養然猶恐因而致傷胃氣胃為倉廩之官水穀之處此十字自軒帝正經傳之古今只曰倉廩之官水穀之海經又曰腸胃為本蓋海字無所不納處之一字皆道聽塗說來更詳脾胃大既充實之人精血自旺何假藥餌滋養脾胃既素充實又如何猶恐一時致傷胃氣況胃屬陽明聖經中指為至陽能腐熟穀畜果菜一切滋味傳於脾分於大腸小腸二便之下其氣上騰何地黃當歸鹿茸便傷其胃氣又呆曰所謂精氣血氣皆由穀氣而生此庸愚亦能知曉何苦便斥用地黃等藥未見其為生血而穀氣已先損矣其說謬甚茲特為詳而陳之無踏志寧謬說斥上品名藥以沮絕後世之滋養補益也孫若斥其三品多甘甘莫甘於甘草經方少有不用者又甘莫甘於蜜而補劑未嘗不假以丸者況稼穡作甘黍稷稻粱麥秫神農皆稱其甘甘受和脾喜甘審此未易以地黃當歸鹿茸而能傷胃氣也若斥其三品能傷胃氣不知如何而傷也傷胃氣者惟穀畜果菜滋味過傷耳經故曰飲食自倍腸胃乃傷又曰陰之所生本在五味陰之五宮傷在五味又曰得之則生失之則死傷之則病審此又未易云地黃當歸鹿茸而能傷胃氣也若斥地黃等藥傷穀氣是又自道聽塗說中來大凡人身胃氣恐其傷穀氣欲其損穀斯能為精為血不損則病有如傷寒差後多食發為食復作熱仲景治法惟日損穀則愈若斥三品不可為退寒熱治虛寒用矣何本草地黃則曰作湯除寒熱當歸則曰虛冷人宜加而用之鹿茸又如何能傷胃氣耶志寧何見併將神農亦為之毀吁大哉孔子天縱將聖刪詩定書約禮明樂繫易而脩春秋亦只述古人之意不易妄作志寧何人哉乃敢以此因世俗地黃亦有可斥者志寧却不能深究地黃一品雷公詔世必以酒九蒸九曝而後用否則有滯脾之禍愚諄諄之告惟祈衛生君子生熟藥肆當作子孫陰德遵雷公製度而志寧又引孫兆云補腎不如補脾為證莫若只以固陽湯調其寒熱不致傷脾是又舍胃而言脾也且如固陽湯即真武湯易其名不能調陰調陽如何分寒分熱無載其方分兩又成大誤本方白茯苓三分白芍藥三分各計重七錢半白术二分則重五錢附子一枚炮去皮臍破作八片只用二片計之未及重二錢許孫方云用茯苓芍藥各三分却合元方則附子當用二錢孫方云用附子三分則附子多用五錢半重謂之合法可乎凡此立說類皆庸盲俚語耳只可一時坐中發為常談安可載于卷冊永遠誤人也至於末後又極其謬曰若勞瘵之疾已成無

藥能療。惟膏肓灸法最為效驗。然或傷晚。亦恐不及。其他證狀。胃風湯逍遥散中具言之。勞瘵灸膏肓既傷乎晚。胃風湯逍遥散可得而入口乎。志寧可謂不學無識之甚者。又按無求子云。水飲內蓄。上乘於肺。為喘為咳。古人治因水而欬。病在陽。則小青龍湯主之。病在陰。則真武湯主之。

咽喉乾燥者不可發汗。成無已註。津液不足也。索矩傷寒新書云。咽喉乾燥。雜合以治。可發汗。

淋家不可發汗。發汗必便血。成無已註。勝胱裏熱則淋。反以湯藥發汗。亡耗津液。增益客熱。勝胱虛燥。必小便血。索矩傷寒新書云。淋家宜平凉藥和解取汗。

瘡家雖身疼痛。不可發汗。發汗則痓。成無已註。表虛聚熱。則生瘡。瘡家身疼如傷寒。不可發汗。發汗則表氣愈虛。熱勢愈甚。生風。故變痓也。龐安時傷寒總病論云。以癰瘡家膿血過多。索矩傷寒新書云。瘡家身疼痛。可平藥和解取汗。

衄家不可發汗。汗出必額上陷。脉急緊。直視不能眴。不得眠。成無已註。衄者。上焦亡血也。若發汗則上焦津液枯竭。經絡乾澀。故額上陷。脉急緊。諸脉者皆屬於目。筋脉緊急。則牽引其目。故直視不能眴。眴。瞬合目也。針經曰。陰氣虛則目不眴。亡血為陰虛。是以不得眠也。索矩傷寒新書云。衄家有汗證可發之。許叔微傷寒九十論衄血證。睢陽張士美。病傷寒七八日。口燥飲水而不嚥入。俄而衄。脉浮緊。身熱。醫者云。傷寒脉浮緊。不發汗因致衄者。屬麻黃湯主之。予曰不可。古人雖云當汗不汗。熱化為血。此證亦有不可汗者。仲景云。陽明病口燥。但欲漱水而不嚥者。必衄。衄家不可發汗。發汗則額上陷。不得眠。不能眴。此只可用小品犀角地黃湯。若當時行麻黃。必額上陷。直視不眠也。

亡血家不可發汗。發汗則寒慄而振。成無已註。針經曰。奪血者無汗。奪汗者無血。亡血發汗。則陰陽俱虛。故寒慄而振搖。潘思敬加減藥證集云。若喉中閉。咽喉乾燥。亡血衄家淋家瘡家不可發汗。已上六證。並宜小柴胡湯。

汗家重發汗。必恍惚心亂。小便已陰疼。與禹餘粮丸。闕。成無已註。汗者心之液。汗家重發汗。則心虛恍惚心亂。奪汗則無水。故小便已陰中疼。雲岐子保命集。太陽中風自汗出。醫反發其汗。必恍惚心亂。以虛而反。又一虛之。則心神虛而恍惚。小便已陰疼。氣虛也。宜禹餘粮丸。蘭室寶鑑類纂曰。恍惚心亂。陽證也。陽虛甚。神明無所據依。則亂也。

病人有寒。復發汗。胃中冷。必吐蚘。成無已註。病人有寒。則當溫散。反發汗損陽氣。胃中冷。必吐蚘也。本發汗而復下之。此為逆也。若先發汗。治不為逆。本先下之。而反汗之。為逆。若先下之。治不為逆。成無已註。病在表者。汗之為宜。下之為逆。病在裏者。下之為宜。汗之為逆。經曰。陽盛陰虛。汗之則死。下

之則愈陽虛陰盛汗之則愈下之則死傷寒醫下之續得下利清穀不止身疼痛者急當救裏後身疼痛清便自調者急當救表救裏宜四逆湯救表宜桂枝湯成無已註傷寒下之續得下利清穀不止身疼痛者急當救裏者以裏氣不足必先救之急與四逆湯得清便自調知裏氣已和然後急與桂枝湯以救表身疼者表邪也內經曰病發而不足標而本之先治其標後治其本此以寒為本也　太平聖惠方云夫病下之後續得下利水穀不止身體疼痛急當救裏宜溫之與治中四逆附子湯諸溫藥之輩雲岐子保命集太陽病傷寒頭疼項強當發其汗反下之清穀不止裏寒也一身疼痛者表寒也急當救裏者先治其本宜四逆湯從少陰本也穀氣裏和外身疼痛後治其表宜桂枝湯病發熱頭痛脉反沉若不差身體疼痛當救其裏宜四逆湯成無已註發熱頭痛表病也脉反沉者裏脉也經曰表有病者脉當浮大今脉反沉遲故知愈也見表病而得裏脉則當差若不差為內虛寒甚也與四逆湯救其裏　汪疇傷寒發明書經曰病發熱頭痛脉沉不差身疼痛當救其裏宜四逆湯又曰下利身體疼痛先溫其裏乃攻其表溫裏四逆湯攻表桂枝湯活人書云兩感病無治法但云治有先後尋第三卷言傷寒下後利不止身體疼痛急當救裏宜四逆湯後身疼痛清便自調者急當救表宜桂枝湯遂以意倣效治兩感有先後宜先救其裏者陽氣內正則不必醫也內纔正急當救表亦不可緩也今按論中此條正與活人書所引救裏救表一條相連正是太陽少陰兩感治法成注不得其意汪君表而出之今又以活人書救表之說足其治法餘經兩感論中無文皆宜倣此兩感於寒熱入臟者不治自有本條也太陽病先下之而不愈因復發汗以此表裏俱虛其人因致冒冒家汗出自愈所以然者汗出表和故也得裏和然後復下之成無已註冒者鬱也下之則裏虛而亡血汗之則表虛而亡陽表裏俱虛寒氣怫鬱其人因致冒金匱要畧曰亡血復汗寒多故令鬱冒汗出則怫鬱之邪得解則冒愈金匱要畧曰冒家欲解必大汗出汗出表和而裏未和者然後復下之太陽病未解脉陰陽俱停必先振慄汗出而解但陽脉微者先汗出而解但陰脉微者下之而解若欲下之宜調胃承氣湯主之成無已註脉陰陽俱停無偏勝者陰陽氣和也經曰寸口關上尺中三處大小浮沉遲數同等此脉陰陽為和平雖劇當愈今陰陽既和必先振慄汗出而解但陽脉微者陽不足而陰有餘也陰不足而陽有餘也經曰陽虛陰盛汗之則愈陰脉微者陰不足而陽有餘也經曰陽虛陰盛陰虛下之則愈　王叔和脉經云此屬大柴胡湯證陰

微一作尺實。孫思邈千金翼方。但陽脉微者。先汗之而解。宜桂枝湯。太陽病發熱汗出者。此爲榮弱衛強。故使汗出。欲散邪風者。宜桂枝湯。成無已註。太陽中風風。併於衛。則衛實而榮虛。榮者陰也。衛者陽也。發熱汗出。陰弱陽強也。內經曰。陰虛者陽必湊之。故少氣時熱而汗出。與桂枝湯解散風邪。調和榮衛。雲岐子保命集。太陽病脉浮而弱。身熱惡風。頭痛項強。自汗不止。榮弱衛強。榮弱者汗自出。血不能守而泄於外。衛不能護。是知榮衛不和也。欲散邪風。宜桂枝湯。

永樂大典卷之三千六百十五

重錄總校官侍郎臣高拱
學士臣瞿景淳
分校官編修臣王希烈
書寫儒士臣陳國泰
圈點監生臣敖河
臣孫世良